



#1336609111

v.11

編註醫學入門 四卷下

腰痛

二平 疝氣

三平 脚氣

燥

四平 消渴

六平 燥結

火

六平 脇痛

七平 夢遺

八平 淋

平 小便不通

一平 小便不禁

一平 脫肛

脾胃

二平 傷食

三平 積聚

四平 蟲瘡

氣

五平 氣滯

血

六平 吐血

八平 嘔血

八平 衄血

九平 嗽唾咯

九平 溺血

九平 便血

痰

一平 喘

三平 吼

三平 惡心

三平 嘈噓

四平 噎氣

四平 嘔吐

五平 飢逆

六平 膈噎

八平 關格

八平 瘕

九平 癰

百 顛狂

百 驚悸怔忡健忘

百 咽喉附失音

百 瘧

百 發熱附惡寒 百 汗

百 痿

百 厥

百 癆瘵

一平 諸虫

三平 水嗣

四庫全書
本草綱目
卷之四
養老附髮

醫部全錄
卷之四

四庫全書

○腰痛

腰痛新久總腎虛

新痛宜疎外邪清熱以則補腎兼理氣血○腰者腎之候一身所恃以轉接

開闢然諸經貫於腎而絡於腰者雖外感內傷種種不同必腎虛而後邪能乘之故不可純用寒藥亦不可純用參

芪補氣痛甚面上忽見紅點人中黑者死外感暴痛寒背拘傷寒必依六經症

見紅點○尋常感冒暴痛不能轉側如寒傷腎者遇天寒發連背拘攣脉沉弦緊五積散加吳茱萸杜仲桃仁痛甚加黑

牽牛少許肢厥者古姜附湯連肩背濕痛重著熱煩燥又者通氣防風湯摩腰升品伸筋法

卑濕雨露侵淫為濕所著腰重如石冷如水喜熱物慰不渴便利飲食如故著腎湯加附子傳永沉重小便不利五

苓散加參熟湯腰重痛準角散久不已羊牛膝浸酒服青娥丸加華蘚最妙○濕熱者長夏夏暑濕相搏或因膏粱

成濕熱者亦同實者二妙蒼柏散加葉胡防風煎服虛者七味蒼柏散弱赤者五苓散清熱湯健步丸有諸藥不效

若用其遂牽牛大瀉其熱而止乃濕熱甚也古

方有以甘遂末三錢和猪腰子煨熟空心酒下風牽脚膝

強難言以風傷腎腰痛左右無常牽連脚膝強急不可俯仰

斷天麻風虛小續命湯加桃仁或烏藥順氣散加五加皮

風挾寒濕者五積散加散用全蝎妙過去蝎獨活寄生湯

若活勝濕湯加味龍見散

或單歲仙烏末酒調服

內傷失志腰膨脹

不旺不能痛

養筋脉腰間鬱鬱膨脹不伸令入屈羸面黑不能久立遠

行亡氣傷筋茯苓加沈香乳香少許虛者當心腎俱補入

參養束湯加

憂怒腹脇痛相須

五臟皆取氣於穀脾者腎

杜仲牛膝

氣不行腰痛連腹脇脹滿肉痺不仁沉香降氣湯木香勻

氣散飲食難化者異香散宗筋聚於陰器肝者腎之同

系也怒傷肝則諸筋縱弛腰痛連脇聚香散中調肝散

七情挾外感有表者入參順氣散烏藥順氣散枳殼散加

葱白通用七香丸痰連背脇積難仰濕痰流注經絡背脇

青木香丸立安丸

加南星蒼朮黃柏風加麻黃防風羌活獨活加姜桂附子
 延丹大便秘者龜板丸○食積因醉飽入房濕熱乘虛入
 腎以致腰痛難以伸仰四物二陳湯加麥芽神麴葛花砂
 仁杜仲黃柏官桂枳殼痛甚者速効散積聚散加味龍虎
 散濕熱者七末
 蒼柏散清燥湯
 閃到痠逆夜偏呼
 閃到跌撲墜墮以致血
 血順氣實者桃仁承氣湯或大黃生薑等分水浸一宿五
 鼓服之夕者補陰丸加桃仁紅花或五積散去麻黃加茵
 香木香檀榔連脇痛者
 復元通聖散加木香
 作勞血脉難週養
 勞力傷腎者黃
 歸杜仲或四物湯加知母黃柏五味子杜仲吞大補陰丸
 熱者獨活湯○勞心者憂勞天王補心丹杜仲煎湯下
 勞慾悠悠或軟如
 房慾傷腎精血不足養筋陰虛悠悠痛
 不能運用者九味安腎丸加杜仲鹿茸百倍丸八
 朱丸加鹿茸木瓜當歸續斷或煨腎丸猪腎酒

○疝氣

病本濕熱標則寒

醉飽勞役房飲忿怒動火火鬱及則生濕津液凝為痰瘀流入肝經肝性急速

又暴為外寒所束是以痛甚有專言寒者論其標耳大要

熱者遇熱則發二便赤澀小腹肛門俱熱外腎累垂玉莖

挺急寒者遇寒則發二便官利脇腹清冷外腎緊縮又

有冷熱不調者外腎小腹或冷或熱二便或閉或利小

腸膀胱腎總由肝

其標末而言其實主於肝也蓋肝環陰器

而上入小腸又肝腎所屬於下與衛任督相附腎與膀胱

為臟腑其氣相通運為外腎系於華元此二經相連相會

然肝主筋華元雖名外腎非厥陰環而引之與玉莖無由

伸縮在女子則為募戶經云邪在小腸連繫系屬於腎貫

肝絡肺心系氣盛厥逆上衝腸胃蕪所散於有結於臍惟

取厥陰以下之及論三臟脉皆以滑為病每云風病者非

外風也乃肝木陽臟氣動之風論三陽病發寒熱言膀胱

非受病之處必傳於肝而後為病又明堂穴法治病皆厥

陰部分可見病主肝經○小腸多氣少血之經忿怒憂思

起於肝而心氣因之鬱結心與小腸為表裏腹外氣聚無

出攻及膀胱腎納氣房勞過度敗精蓄為水氣滯入裏

胞絡真氣膀胱氣脹然皆肝所主也所以病發不特外腎

小腹作痛或改刺腰脇或遊走胃背或搶心痛或連臍痛

男子遺精女久不月令人羸瘦少氣洒淅寒熱食少嘔吐

吞酸久則遂成暴吐其則角弓反

張發牙戰汗冷汗流不止者難治

大綱囊痛引小腹病有

痛者有連小腹痛者感及觸怒則壅物逆上

囊根心和氣平則壅物自循腎系歸入囊中

水筋氣血孤

癰寒

水疝囊腫如水晶或囊痒而流黃水陰汗自出小腹

按之依水聲得於酒行房遇外部結於囊中

筋

兩陰莖腫脹或挺長不收或痛痒至極得於房勞

血疝如黃瓜在小腹兩傍陰云便毒得於春夏大燠氣勞於使

內血滲入得囊結氣癰腫

氣疝上連腎俞下及陰囊得

於號哭忿怒氣鬱而脹或勞役坐馬致按腫脹偏有大小

者難治

孤疝狀如仰月則入小腹如狐之晝出穴而

弱夜入穴而不溺亦與氣疝大同

癰疝有兩種

寒疝囊冷結硬如石陰莖不舉或控筆左而痛得於寒濕

便內過勞久而無子此七疝之名從經旨也餘皆謬妄

痛

取九病久則成積盤附臍之上下左右為痕為癢

陰癰腫痛硬如石

此即癰病在婦人則為陰

尸突出寒勝則痛濕勝則腫寒濕相搏熱毒又重則腫硬如石○腸癰即小腸氣吊外腎偏墜腫痒○如癰玉莖腫硬引臍絞痛甚則陰縮肢冷囊上生瘡成癰二症出水不止者死○氣癰素有濕熱因怒激起相火昏眩手搖如狂

面黑筆丸能左右相過氣癰飲更連施石丸寒冷者五積散蟠葱散當歸四逆湯木香白氣散青木香丸柴萸肉消

名黑錫丹○水癰外腎腫大如斗如升下痛不痒得於卑濕五苓散加小茴非汁為丸畢作茹湯熟者二白散橘核

散久者橘核丸硬木不通腫偏丸

此又言癰病之中有木腎者有偏墜者○木腎堅硬頑痒不痛

乃心火不下降腎水不溫活腎丸四製柴萸丸四妙川練七或單用雄指樹葉不結子者是晒乾為末酒糊丸種子大

每五十丸空心鹽酒下又有跌傷驚氣與敗血攻入者當消瘀血○偏墜腫有大小偏左多瘀血怒火或腎氣虛橫

偏右多濕痰食積是知癰病症兼七病治宜詳審故特抽言之外治藥腰膏○小兒偏墜此丹皮散○婦人子宮寒

出有寒濕者澤蘭葉散金液用有熱則不
治詳內外宜疎

利病雖濕熱然生於陰起於下四氣每先傷足三陰部分

痛身頭桂枝湯有吐者四君子湯如若活附子○寒症心

痛筋縮肢冷食已則吐古施附湯五積散加吳萸小茴及

食鹽少許西裝萊菔丸硫病丸○暑症小腹痛急瀉瀉香

如散加覆麥木通○濕症身重小便不利大便或瀉五苓

散最妙濕熱入裏暴痛藥當者加減柴苓湯加枳入正散

濕熱者氣病飲古更連丸寒冷者蠶葱散生料木香白氣

散○通用五苓散猪苓澤瀉分陰陽以和心與小腸白木
利腰膝間濕及死血茯苓利膀胱水不得桂則枯故用以
伐肝木風換桂枝寒加紫蘇生薑鹽少許暑加白芍濕加
白朮小腸氣加小茴膀胱氣加金鈴子橘核香薷加檳榔
小通消痰痰積補虛煩有疳乃濕痰食積痰血下聚而成

○瘕痢海石香附二味姜汁調服瘕飲食積者守効左○
食積瘕血者施挑杖查散失笑散食積按熱者積病左食
積按虛者八味茴香丸○虛病暴痒四君子湯加川練子
茴香枳實山查山拖按之不痛者加肉桂姜汁按之不定
者用桂枝白頭山拖為末姜汁糊丸姜湯下大能却痛久
者三黃內消丸凡虛病不宜預補經云邪之所湊其氣必
虛留而不去其病則實必先瀉其所蓄之熱而後補之是
以諸方多借巴豆氣者此也虛甚上為吐逆下有遺精者
危要知濕熱為病俱宜瀉南補北不可妄用剛劑○久成
癥瘕腹滿氣積如臂者白芍散或聖中湯加阿膠腹痛有
塊盤積傷者聚香飲子葫蘆芭九腹痛有塊附臍下者去
鈴方欲作奔豚者茯苓桂枝甘湯奔豚病者大七氣湯加
炒牽牛○通用二陳湯加姜汁積加枳實山查熱加山拖
痛加橘枝瘕血加玄胡索枳仁熱加水香茴香川練子痛
甚加乳香沒藥荔枝枝按腎大如斗加茴香青皮昆布海藻
為丸服水煎加猪苓澤瀉以逐水筋痛加黃連白朮茯苓
以降火血病合四物湯以調血不愈清肝益榮湯或清胃
氣湯氣病加柴胡青皮香附行氣氣病加青皮香附蒼

木逐氣流經更以蜘蛛十四枚桂枝五錢為末蜜丸米飲
下癰疽加白朮蒼朮猪苓澤瀉煎調荔枝散寒病加吳萸
姜桂溫散○常用辛平破血消瘀積之劑橘核散辛溫散
氣溫散之劑五炒川練丸四炒川練丸金鈴丸四味茴香
散古玄竭散辰砂一散
丹神聖代針散選用

脚氣

脚氣須知有濕乾

脚氣內經各陽兩葉各緩風初病不覺

類傷寒但初起則卒然脚腫發則旬月又作為異○濕者
筋脉弛長而軟或得腫或生腫瘡之類謂之濕脚氣宜利
濕疎風○乾即熱也乾者筋脉脆縮癢痛枯細不腫謂之乾脚氣宜潤血清燥
內因食積外風寒
內因好食乳酥醢酒濕熱下流所啓加之房勞故富貴之
人亦有脚疾外因久坐久立濕地或貧苦跋涉山溪瘴毒
夏月則感濕熱之氣發則四肢多熱冬月則感濕冷之氣
發則四肢多冷加以當風取涼汗出洗足醉後入房故成

此疾外感止於下脘腫痛內傷或至手
節週身初起察其起處隔蒜灸之最妙
濕勝則腫除濕湯加檳榔防已腰腫者紅花蒼柏丸肥人

加痰藥赤裂腫痛甚者用耳遂為末水調敷腫處另用耳
草煎湯服之立消或敗毒散加蒼术木黃搜風順氣丸

○濕熱寒則痛五積散不換金正氣散附子六物湯勝駿丸
○濕熱風則走注不常烏藥順氣散地仙丹甚者用赤芍

草烏等分酒糊丸服以切之挾瘀血者復元通聖散合消
風散○濕熱熱則腫痛異常加味蒼柏散二炒蒼

柏散清燥湯○食積濕痰下注者檳榔蒼柏丸
虛火軟

緩痺且頑軟痺者乃膏梁火乘肝腎以致血氣溢則痺厥
不仁虛則軟緩無力或麻木不舉三妙丸搜風

順氣丸然腎主骨虛則骨軟陽虛附虎四片丸陰虛虎潛
丸腎氣丸脚軟筋痛者太補陰丸去地黃加白芍知母甘

草倍牛膝肝主筋虛則脚膝頑麻養
真丹肝腎脾俱虛者五穀三匱丹
在下升之衝上降

氣在下隨氣血痰藥中加防風蒼术升提其濕衝心則恍
惚嘔吐不食脉大者死宜木香流氣飲或蘇子降

氣湯吞養正丹有火者四物湯加黃柏以降之再用附子
未津調塗湧泉穴引勢下行入腹不仁喘急欲死者木
散腹脹煩燥者松節湯入肺喘咳小青龙湯加檳榔入肝
頭目昏眩喘滿逼促者桑葉平氣散入腎腰脚腫脹小便不
利目額皆黑左尺絕者死牛膝散加大黃救之如少陰腎
氣入心乃水尅火也急宜入味丸救之有脚氣寒熱足腫
心煩體痛垂死者杉節湯下食加砂仁青皮木瓜外用桃
柳桑槐楮五枝煎湯洗之消腫佳痛須先喫酒三五盞最
忌熱藥蒸泡恐逼邪入經絡
故治脚氣疎通氣道為佳
表汗裏下任湯丸
火燄成毒腫上于三陽寒熱嘔惡身痛且重者主絳湯主
之或香蘇散加木瓜檳榔七情丹加五加皮木香痛加赤
芍忍冬藤婦人加當歸○三陰裏症胃滿怔忡通體轉筋
二便閉澀或自利者若結蘊滯湯除濕丹導水丸搜風順
氣丸痰痰者三花神祐丸挾食積者開結蘊飲丸裏虛
者獨活寄生湯換腿丸表裏兼見者左經湯加大黃
跟痛轉筋皆血熱亦有痰火及風寒
脚跟痛有血熱者四
物湯加知母黃柏牛

膝有痠者五積散加木瓜或開結道飲丸。脚腫筋有血
 熱者因物湯加酒芩紅花有筋動於足太指上至大腿近
 腰結了者此奉養厚因風寒而作又當加蒼木南星感濕
 者除濕丹常用松節二兩乳香一錢慢火焙存性為末每
 一錢木瓜煎酒調服。有螺上生一孔約深半寸至下半
 日疼異者此濕毒注成漏也用人中白炙出水滴入瘡口

燥類

消渴

消渴先明氣血分

經曰二陽結謂之消渴二陽者手陽明
 大腸主津液足陽明胃主血津血不足

發為消渴又有燥結者肺與大腸為表裏也有氣分渴者
 因外感傳裏或服食僭燥熱耗津液喜飲冷水當與寒藥
 透劑以清利其熱熱去則陰生而渴自止矣有血分渴者
 因內傷勞役精神耗散胃氣不升或病後胃虛亡津或餘
 熱在肺口乾作渴喜飲熱湯當與甘溫酸
 劑以滋益其陰陰生則燥除而渴自止矣
 總是大火炎不必

問、消者、燒也。如火烹燒物理者，也。三消上中既平，不復傳下。上輕中重下危，總皆肺被火邪薰蒸，日久氣血凝滯，故能食者未傳癰疽，水自溢，也不

能食者未傳脹滿，火自炎也，皆危。

上消引飲便如常，熱在

心肺煩燥，舌赤唇紅，少食引飲，小便數者，四物湯合生脉散，加天花粉、地黃汁、藕汁、乳汁、酒客加葛汁，能食者白虎

加參湯，不食者錢氏白朮散，清心蓮子飲。又膈滿者謂之

一湯益元散。中消善饑無尿糞，熱蓄中焦脾胃消穀善饑不甚，消小便赤數大便硬者，四物湯

加知母、黃栢石、蒸黃芩、滑石，以降火熱甚者，調胃承氣湯

三黃丸。初病寒中陰勝陽鬱，後變為熱中者，升麻葛根湯

瀉黃散。濕積者消渴痞丸，虛者錢氏白朮散。便閉者當

歸潤燥湯。泄瀉者白朮芍藥湯。上中二消者，蘭香飲子。心

火乘脾者，黃連猪肚丸。肝侵氣衝肌熱不食，食即吐衄者，

烏梅丸。鐵粉丸有重耗其津液者，單苦練湯。水停於下，變

為臍腫者，五苓散。或

腎消溺濁陰莖強，熱伏下焦，腎分精竭，引水自救，隨即

溺下小便混濁如膏淋然腿膝枯細面黑耳焦形瘦者四
物湯加知母黃柏五味子玄參人乳汁善調水火或補陰
丸腎氣丸先坎離丸八味丸去附子加五味子玄參虎骨鹿
角丸夢授大主補心丹威喜丸妙香散單藟系湯或十全
大補湯去桂倍地黃加知母黃柏上熱下冷者清心蓮子
飲○有五石過度之人真氣既盡石氣獨留陽道與強不
交精泄者謂之強中小便或油膩或赤黃或白或濁而
且利或渴而不利或不渴而利飲食滋味入腹如湯沸雪
隨小便而出落於溝中結如白脂肌膚日瘦者無治法
保肺滋腎脾自運
久則滋腎養脾蓋本在腎標在肺腎燥則氣上升而肺潤
腎冷則氣不升而肺焦故腎氣丸為消渴良方也然心腎
皆通乎脾養脾則津液自生參苓白朮散是也三消通用
單文此為末水調服回津止渴卑以藥根尤消渴神藥大
忌半夏燥劑○抑論水包天地人身臟腑亦津液真水所
包然有形者凡水也兌也坤也無形者天一所生之水氣
也坎也乾也能以無形之水沃無形之火是謂既濟雜病
渴多虛熱實熱者少凡渴後忌針灸令瘡口出水而死

燥結

燥結兩字亦有辨

燥有風燥熱燥火燥氣血虛燥諸燥門結有能食脉實數者為陽結不能食脉

弦微者為陰結亦有年高氣血虛結者

燥潤結通無後患

燥屬少陰津液不足辛以潤之結屬

太陰有燥者若以瀉之凡結後仍服潤劑

濕熱鬱脹滿熱有時

血生津之劑免其再結再通愈傷元氣濕熱鬱脹滿熱有時為實無時者為虛有藥不盡者大小便閉氣脹如鼓者三和

散合三黃湯飲食盡者

溼少臟寒七情憤

津少因發汗利小便過多及產

香連丸胃火者白虎湯

後失血等症血夜枯者五仁丸腎氣丸大補陰丸或滋帶

通由陽加濕鬱條全陳皮氣虛者參仁丸補中益氣湯挾

亡情者古交濟丸臟寒則氣逆臟冷則血枯有痰癖冷

氣結滯者古半硫丸古姜附湯五積散米冷與之其病雖

宜服陽藥若大便不通者亦當暫與潤劑微通大便不令

閉結○亡情氣閉後重窘迫者三和散六磨湯如脉浮晝

便難者用陳皮杏仁等分蜜丸服脉沉夜便難者換桃仁○瘰癧不通者二陳湯加枳壳檳榔宿食秘喘審熱寒傷熱物者二黃丸傷寒物者丁香香脾積丸流行肺通用大黃備急丸有脾胃伏火者潤腸丸氣無遲慢肺與大腸為表裏故也枳梗湯加紫蘇或蘇子弱約束津液不能四布但輸膀胱故小便數而大便難此脾約丸之由制也但脾屬陰虛火燔金耗則肺失傳化元宜滋陰養血在西北壯實者以脾約丸開結可也東南氣血虛者潤燥為主○通用冷熱灸法撻脂法麻油導法

火類

脇痛

脇痛本是肝家病

痛引小

宜分左

右審實虛

左右者陰陽

之道路也左

肝陽血陰右肺陰氣陽實者肝氣實也痛則手足煩燥不安小柴胡湯加芍歸白芍蒼朮青皮龍膽草或車黃連

九虎若肝血虛也痛則悠悠不止耳目瞋瞋善怒如入箱
捕四物湯加柴胡稍或五積散去麻黃加青木香青皮虛
甚成損胸下常一黑痛不止者各乾服痛甚危入物湯
加木香青皮桂心有火去桂加山梔或吳萸水炒黃連左

為怒火與死血

大怒氣逆及謀慮不決或外感風邪皆令
肝火動其脇痛難忍古黃連九當歸龍薈

九輕者小柴加黃連牡蠣枳壳○瘀血必歸肝經夜痛或
午後發者都是小柴胡湯合四物湯加枳仁紅花乳沒痛甚

者古枳芍散便堅黑者桃仁承氣湯或漏青丸皮痛吐血
者熱傷肝也小柴胡湯加芍歸生地外用韭菜熨脇及琥

珀膏 右食痰飲七情居

食積脇下如扛掣起一條作痛神
保九枳實煎湯下輕者保和丸○

痰飲流注肝經喘咳引痛者二陳湯加南星蒼朮川芎柴
胡白芥子或入青黛少許姜汁二匙痰甚者控涎丹如胃

背脇痛喘急妨悶者瓜蒌實丸○飲水停滯脇下如捕痛
者濃煎葱白湯調枳壳煮散甚者用傷寒水症治法○七

情凝滯如有物刺痛氣促嘔吐者分氣紫蘇飲流氣飲子
調中順氣丸鬱氣挾食連乳痛者推氣散並煎散悲哀傷

者枳壳煮散四味枳實散一

兩脇常兼左右症

濕熱盛則兩脇痛當

歸龍薈九諸脇痛皆効如痛不可舒伸者用此九二錢半加姜黃桃仁各五錢蜜九或煎服○外感脇痛寒熱者小

柴胡加枳便詳傷寒久久成積還有餘

脇痛二三年不已者乃痰結成積塊肝積肥氣肺積息

貫發作有時雖皆肝木之餘不可峻攻宜枳朮九加官桂陳皮桔梗甘草蜜九服或復元通聖散附晚膳方

夢遺

夢遺之病全屬心

交感之精雖常有一點白膜裹藏於腎而元精以爲此精之本考實在乎心日

有所思夜夢而失之矣治宜黃連清心飲或十味溫膽湯妙香散定志丸

相火一動走精金

人身

之精貴於金寶初因君火不寧久則相火擅權精元一於走而不固甚則夜失連連日亦滑溜不已宜先坎離丸有火盛精中多有紅絲入之溺於桶澄視之便見後生子一歲身生紅絲痛下救宜補陰丸腎氣丸不信無夢

而遺者念頭將動精先沈

氣宜降精宜升慾心一動精隨念去凝滯久則莖中痒痛常如

欲小便然或從小便而出或不從便出而自流者謂之遺精此之夢遺尤甚宜草薢分清飲或八物湯真珠粉丸

日久

有虛無寒

水虧火益燥

滋陰降火湯

脾胃濕熱亦相侵

君火失權而相

火乘脾濕與熱合脾土全是死陰少運飲食易於侵犯宜檮栢丸脾虛弱者三灰檮栢丸猪肚丸如原非心腎不之交

果因飲酒厚味乃濕熱內鬱中氣不清所化之精亦皆濁氣歸於腎中而水不寧靜故遺而滑也宜補陰藥中加人

參升麻北胡以升胃中清氣更宜節飲食以固命根也意精字從米從青生於穀之清氣也養生者味之固有

年高

陽虛脫者

四十以後勞傷氣血不能固守者養榮湯加裁吞單檮皮丸或小兒絲子丸如早年

慾過陽脫者究源心腎丸青娥丸黑錫丹縮泉丸金鎖正元丹氣陷者神芎湯

却無精滿溢而淋

有日年壯久不御女精滿而溢者深為可笑人之臟腑惟氣與血神則主宰其中而無形迹可見精乃一時交感三

焦之火吸撮而成。豈先有精於中耶。惟節色氣血漸盛而精不消。薄理也。其不御女而漏者。或聞淫事。或見美色。或思想無窮。所願不得。或曾入房。太甚。宗筋弛縱。發為筋痿。而精自出者。謂之白淫。蓋腎臟天一以慳。為事至意。則精全而固。去思外淫。居室太甚。服藥滋陰。戒酒色。宜乎滲漏而不振也。單黃柏丸最妙。

心先要斷真淫 亦有清心靜坐。養精神者。但好色種子。猶在不免。有時發露。或被盲久。指示房中。補益之說。以為可以止精。不獨然對景忘情。實際不復戀乎。隈褻之事矣。故曰學仙。不斷淫。蒸砂飯不成。養生者慎之。通用單五味子膏金櫻膏水陸二仙丹金鎖思仙丹艾實丸。秋石固真丸。固精丸。單非子散。威喜丸。石蓮散。金櫻丸。

○淋

五淋氣血石膏勞

淋。小便澀痛。欲去不去。去不去。又來滴滴。不斷。○氣淋。澀滯餘瀝不盡。沈香散或。

益元散加茴香木香檳榔。○血淋。澀痛遇熱則發。白薇赤芍等分。為末。酒調服。二錢。或犀角地黃湯。單車前飲四物。

湯加知柏選用色鮮者心與小腸虛熱也導赤散去甘草
加黃芩色如豆汁者腎與膀胱火也五淋散又有一種小
便見血而不痛者為溺血非淋也四物湯加山施滑石牛
膝或單苦黃菜飲單髮灰散單琥珀散○石淋溺有砂石
莖強痛甚單牛膝膏單鱉甲為末酒調服○膏淋血凝如
膏用黑豆一百廿粒甘草一寸水煎臨熟入滑石末一錢
空心調服或海金沙散○勞淋痛引氣衝遇勞則發痛墜
及房透關散勞傷四物湯加知柏滑石琥珀虛甚者鹿角
霜丸○熱淋暴淋痛甚八正散或五苓散合敗毒散加味
石羔湯急痛者六一散二錢加水香檳榔小茴各一錢為
末服○冷淋必先寒慄而後溲便澀數竅中腫痛生附散
二朮散○淋皆屬熱間有冷者外因當風取涼冒暑濕熱
鬱滯胞內痿痺神不應用內因七情心腎氣鬱小腸膀胱
不利或忿怒房勞忍溺酒肉濕熱下流膀胱干於肝經廷
孔鬱結初則熱淋血淋久則火渴不渴間差聲毫熱在上
燥為砂石淋如湯鐘煎久生礪渴不渴間差聲毫焦氣分
渴而小便不利者肺中伏熱水不能降宜氣薄淡滲之藥
清金瀉火以滋水之上涼清肺飲子熱在下焦血分不渴

而小便不利者腎與膀胱無陰而陽氣不化水枯火升宜
氣味俱陰之藥除熱瀉開以滋水之下源滋腎丸腎氣丸
前消渴以渴為主而分氣血故血分亦有渴者此以淋為
主而分氣血故血分有不渴者但渴而多汗亡津又未可
以輕清熱利便人人曉治暑淋熱淋血淋山梔仁開行滋
滲也

破東垣高治膏砂石淋鬱金琥珀開鬱青皮木香行氣滯
黃牛膝破血黃柏生地滋陰東垣用藥凡例小

腹痛用青皮疎肝黃柏滋腎小腸澀脹脾經濁小腹脹痛
蓋小腹小便乃肝腎部位

湯火府丹凡小腸有氣則張有血則澀有熱則痛又土燥
水濁宜四君子湯加滑石澤瀉麥門冬淡竹葉痛者六君子

子湯加知柏肝家莖脇刺如刀肝經氣滯有熱者用甘草
石常璵珀稍五錢青皮黃柏澤瀉各

錢水煎服或三味葶藶散莖痛引脇者參苓琥珀湯腎
腸痛引腰背者破石湯虛者清肝解鬱湯清肝葶藶湯

虧惡症精敗竭腎虛淋瀝莖中澀痛者加裁八味丸以補
陰小便頻而黃者四物湯加參朮麥門冬

五味子以滋肺腎小便短而黃者補中益氣湯加麥門冬
五味子山藥以補脾腎熱結膀胱者五淋散以清熱脾肺
氣燥者芬花二味以清肺若膀胱陰虛陽無生者滋腎丸
膀胱陽虛陰無以化者腎氣丸○精敗竭者童男精未盛
而絕女老人陰已衰而思色以降其精則精不出而內敗
室中痛澀為淋者八味丸料加車前子牛膝煎服若精已
竭而復耗之則大小便中牽疼愈疼則愈欲大小便愈便
則愈疼倍附子救之凡此當滋化源不可誤用知柏淡滲
等劑既瀉真中虛總難利膀胱中氣既弱不能運通水道
陽復損真陰下輸膀胱若補中益氣湯

凡汗多亡津瀉久胃乾諸瘡失
血俱宜滋補不可過利小便
痰飲帶轉脬何足異吐提

一法免呼號
精痰在肺以致膀胱不通響之水盡上竅閉
則下竅不出宜陳湯探吐或灸百會穴皆

以開上竅也蓋膀胱雖主水道而肺金為水之化源也○
脬系轉戾脬下併急而痛小便不通名曰轉脬有因熱逼
或強忍小便氣逆脬轉者二石散加車前子木通等分水
煎外用炒鹽熨脬冷即易之○因氣者先用良姜葱白蘇

葉煎湯熏洗小腹外腎肝門拭乾伸脚仰臥後用葵子赤
茯苓赤芍白芍等分入鹽一字煎調蘇合香丸服之○忍
尿疾走及忍尿飽食者二陳湯探吐○忍尿入房者補中
益氣湯提之陰虛兩尺脉絕服諸滑利藥不効者腎氣丸
陽虛者八味丸或附子澤瀉等分燈心煎服此
危症也體薄性急人多有之雄孕轉腰見婦人

小便不通

小便不通本實熱

經曰膀胱不利為癰候其鼻頭色黃者
小便必難腎主水溺於膀胱泄於小便

實熱通也然腎應於心心火盛則小腸熱結熱微則小便
難而僅有熱甚則小便閉而絕無宜清熱生津為主車
硝散五苓散臍下脹者加琥珀或單琥珀為末蜜丸人參
茯苓煎湯下或搗生車前子自然汁入蜜一匙調服有利
大便行而後小便利者八正散加木香熟盛莖中瀉
痛者真赤散加山梔大黃或麻子仁丸冷熱發法

有痰有氣結

虛損久病自汗五內枯燥及諸瘡失血過多
者人參養榮湯有精竭不痛莖痒者八味丸

有胃弱不能通調水道下輸膀胱及氣虛者四君子湯加黃芪升麻有脾痞亡血及勞傷血虛者四物湯氣血俱虛者八物湯○痰涎阻滯氣道不通者導痰湯加升麻○忿怒氣結閉竭不通者二陳湯加木香香附木通俱先服一盞後煎查探吐以提其氣氣升則水自降矣實熱砂糖調牽牛末一二錢探吐尋常赤澁宜清心上熱者導赤散加黃連燈心下虛者滋陰丸上盛下虛者清子蓮子飲○胎痺腸痺分利訣胎即寒淋小便痛引臍腹上清涕著腎湯熱者瀉腎湯○腸痺乃強泄小便閉澀津液偏滲後便宜分利而已

小便不禁

小便不禁不自覺赤者為熱白者虛

實熱乃膀胱火動四苓散合三黃湯加五

味子山茱萸少許重湯四苓散合四物湯加山茱升麻○虛乃腎與膀胱氣虛十全大補湯加益智仁或縮泉丸六味絲子丸二苓左選夜陰盛愈多內虛自汗者秘製丹內溫濕熱者腎氣丸八味丸戒澤瀉附子加五味子杜仲故

紙倍山茱萸內虛寒冷者古

桂附湯太史線子丸加肉桂

心脾勞者頻頻少

輕於不禁勞心者妙

香散桑螵蛸散勞役傷脾者

補中益氣湯脾約症見傷寒

不約多遺或瀝餘

下虛內損則膀胱不

約便溺自遺或尿後餘瀝皆火盛水不得寧治宜補膀胱

陰血瀉火邪為主而佐以牡蠣山茱萸五味子之類不可

溫藥古方補陰丸最妙婦人產後

傷胞小兒胞冷鷄腔散主之

脫肛

脫肛全氣下陷

難經曰病之重實入者為實出者為虛肝門脫出非虛如何勞倦房慾過度及

產育用力冬痢久瀉小兒叫呼耗氣俱有此症宜參底芩

歸升麻水煎服血虛加芍藥地黃虛寒加炒黑乾姜虛按

熱者縮間有熱者病乃暫熱則流通意也氣熱者用條芩

砂散六兩升麻一兩麝香丸服血熱

者四物湯加黃柏升麻風邪者敗大補肺腎兼升提肺與

毒散暑熱者黃連阿膠丸薄荷煎

為養裏肺熱則肝門閉結肺寒則肝門脫出必須溫肺
補腸胃宜補中益氣湯加訶子檳皮少許或升陽舉經湯
蠟皮散釣腸丸挾濕熱者升陽除濕湯有兼痢者四
物湯加槐花黃連升麻有腎虛者腎氣丸八味丸
敷藥洗藥亦可

內傷類

傷食

傷食惡食分上下次審寒熱行吐瀉胃滿噎噎心口腹

疼發熱

胃有伏火或似霍亂

皆因食不化

停於上脘氣壅痰盛者宜吐如傷冷食腹脹氣逆噫

氣吞酸惡心欲吐不吐宜平胃散入鹽少許探吐如傷熱物或酒麴發熱心口刺痛停痰停飲伏火宜二陳湯加黃連枳實探吐傷重填塞胃中下部無脉體實年壯者方敢散吐之尋常飲食過飽在膈以手探吐為好停宿中

下脫者宜下以逐之如傷冷物腹脹痛者木香見觀丸
丁香脾積丸感應丸如傷熱物痞滿者二黃丸日晡潮熱
盛者小承氣湯寒熱兩傷者大黃備急丸除原散體弱者
下藥兼補保和丸凡傷食乃中焦血病如牽牛猛烈傷氣
及下劫峻攻反傷胃氣又現有吐者二陳湯加砂仁黃連
青皮枳實現有瀉者胃苓湯加山查麥芽或三白湯隨時
令寒暑選用如身受寒氣口又傷冷初得便
宜辛溫理中稍久鬱而為熱當兼辛涼散之吐下未淨消
導之紅丸子枳木丸保和丸大安
吐下已虛補益借四君

六君子湯補中益氣湯
酒客分消與調中
飲酒與水過者宜上汗下

微汗即愈參劑五苓散調中二陳湯如久困於酒或傷灰
酒成積腹痛太便秘迫者酒蒸黃連丸香連丸如傷酒
逆眩暈頭痛如破者補中益氣去白朮加半夏白芍芍
乾葛川芎有塊者更加莪朮木香如善飲每早長嘔不吐
若小調中湯最妙一月三五次服之亦可為丸如醉飽行
房以致蓄血胃口時痛者大調中湯或八物湯加砂仁之

類有痛飲不醉忽糟粕出後發者四物湯加
海金砂木香攪樹木通桃仁數服可安○喫茶成癖者星
木憂思鬱抑藥兼霸附炒黃連白芍姜汁蒸餅糊丸服全
不食者溫膽湯神効憂思兼傷食者木香化滯湯○瘦倦
氣抑不食者二炒蒼朮散加香附白芍陳皮半夏黃連扁
栢等分白朮為君姜汁炒丸服濕痰
氣滯不食者三補丸加蒼朮倍香附

積聚

五積六聚皆屬脾

經曰積聚癥瘕痞滿皆太陰濕土之氣始因外感內傷氣鬱滯而留之以

成積○積者陰氣五臟所主脉沈伏或左或右發有根痛
有常處肝積左脇下曰肥氣言風氣有餘而血隨氣不行
也令人脇痛痠痛心積臍上曰伏梁言如梁之橫於心下
令人煩心乃火之鬱也忌熱藥與炙又腸癰與此相似但
身股背腫環臍而痛為癰脾積胃脘稍右曰痞氣言陽氣
為熱所蓄也令人黃疸倦怠飲食不為肌膚仍忌熱藥肺

積右脇下曰息貫言喘息奔而上行也今人咳嗽肺癰腎
積發於小腹或委心下曰奔豚言若豚之奔衝上下無時
也今人喘逆骨疼最難治諸積勿輕吐下徒損真氣積
亦不丟奔豚尤不可吐五積古有五方今皆損五積九更
妙○聚者陽氣六腑所成脉流結或隱或見發無根痛
無常處散聚湯七氣湯香薷九太阿魏九太安九加參左

右中間移不移

氣不能作塊成聚塊乃痰與食積死血有
形之物而成積聚癥瘕一也有積聚成塊

不能移動者曰癥言堅硬貞固也或有或無或上或下
或左或右者曰瘕言假血而成蠢動之形且有活性左

死血旁右氣積

治之破血為主海石九或當歸龍薈九料
五錢加桃仁姜黃各一兩蜜九○治右調

氣青皮湯木香分氣九有積者消積正元散紅九
子小阿魏九或當歸龍薈九保和九俱加鷓鴣屎
當中痰

結一團而

中乃水穀出入之路飲食七情鬱積成痰百鍊
九白芥九凡痞塊在皮裏膜外俱宜二陳湯加

補氣行有餘消導分新久積初為寒宜辛溫消導大七氣
氣藥湯烏白九大小溫中九退黃九

阿魏揮氣丸久則為熱宜辛寒推蕩木香檳榔丸通玄二
八丹消塊丸通用纂積丹生膠膏有虫者妙應丸外治三
聖膏三後煎不足平補是上醫陽虛有積易治惟陰虛難
神効阿魏散以峻補痞積又忌滯藥止
宜早服滋補藥中加驚神龜板秋石丹午服枳木丸太安
九或醋煎丸善消融化為妙若痞積滯冷貫臍誤為沈寒
痼冷投以姜附熱藥初服甚與病情相宜久則痞積益甚
真氣傷而陰血燥矣但疏附固不可服如知和門冬寒涼
傷脾滯氣亦所不宜古云衰其大半而止又云養正積自
除皆為濕損有積而言也平補之外更能斷厚味節色慾
戒暴怒正思愚庶乎萬全

蠱瘴

皆因飲食不節
居而得政附

中蠱害久俗不妍

據方書蠱有數種皆妖昧變成之氣其
怪使然人有造作而得之者多取虫蛇

之類以蘊盛之使其口相啖食其間一物獨存者則以酒
肉祭之取出於毒於酒者中以害人毒發令人面自青黃

力之身痛嘔吐鮮血小便淋瀝大便膿血唇口乾燥胃脘妨滿腹高如虫蟻又如虫行病人所食之物皆變化為虫侵蝕臟腑蝕盡則死死則病氣流注復染傍人一人死則精魂反為其家代力致富不知有此事否萬病併毒丹東坡藥主之或於足小指尖處灸三壯即有物出酒飲得之隨酒飲出肉菜得之隨肉菜出凡中蠱毒不論年月遠近但煮鷄卵一枚去壳以銀釵插入外中併入口中含一飯頃取出視之釵外俱黑即為中毒二法令患人嚼津於水沈則是蠱浮則非也又法口含大豆豆脹爛而破脫者是蠱否則亦非也如出外須用預知子置衣領中遇毒則有聲凡中蠱之人用藥已瘥自後飲食求不得喫更有挑冷若飲食帶冷則鬼氣乘之毒虫復生竟不能救

生及毒泉

嶺南多有瘞生毒者乃木瘞毒於魚肉菜菓酒醋之中以害於人其候初覺胃腹作痛次則漸漸

攪刺痛十日則物生能動行上脘痛流下腹痛在上脘者用膽礬末五分投入熱茶內溶化通口服之探吐在下焦者用礬金末二錢米湯調服瀉下惡物後以四君子湯去甘草調之如脇下急腫傾刻生癰大如碗許者用升麻末

二錢錢熱水調連服瀉出如葱根其腫即消後以平胃散
兼進白粥調之○江南溪澗中有射士毒或因雨潦逐水
而入人家食沙射人之影得之寒熱悶亂頭目俱痛亦如
中風卒不能語又有水毒魚一名溪溫得之病同射士但
有爛瘡為射士無瘡為溪溫又有沙虫細如疥虫遇陰雨
則行出草間著人則入皮裏痛如針刺是三者為病朝輕
暮重手足冷至肘膝二三日腹中生虫食入下部臍中生
瘡不痛不痒急視下部有瘡赤如截肉者為陽毒最急如
鯉魚齒者為陰毒稍緩要皆殺人不遇二十日也用蒜搗
濃汁煎溫洗之是水毒身體當發赤斑否則非也當以他
病調治消水瘡氣寒溫分內外東南兩廣山峻水惡地濕
毒飲子主之溫熱如春秋時月外感霜
毒寒熱胃弱不食此毒從口鼻入也宜清上熱解內毒降
氣行痰不宜發汗平胃散加苓連升麻北胡桔梗枳壳木
香木通善煎服如寒月外感風寒氣閉發熱頭疼自汗如
瘧南人氣外或胃弱痰壅飲食不進與北方只傷表而裏
白利者不同宜解表清熱行痰降氣二陳湯如北胡黃芩
蒼朮羌活川芎水煎服微汗即止如內傷飲食得者理脾

勞者一粒金丹熱者柴苓湯承氣湯三黃湯合竹葉石膏
 湯或三黃不服水土與瘴同源平洋土堅水熱山谷土潤
 大土風氣冷熱加減或變瘴痢黃疸瘡癰俱於各類求之
 然以扶脾胃為本凡綠酒色及食魚肉味新菜菓皆生
 冷糯飯燒酒及油炒醬燂鷄鴨麪食過饑過飽歇臥房
 穢氣半夜失蓋早行沾露空腹出外皆能發瘴仕宦商賈
 遊外俱宜節飲食謹起居以防之

氣類

氣滯

此即諸氣專抽氣
 滯一邊詳言之耳

氣滯不行辨冬新濕熱瘵積是其因

蒼天之氣清淨不息
 變為雲霧為雷雨者

洋濕熱薰蒸也人身元氣與血循環無端彼衝擊橫行
 於臟腑之間而為疼痛積聚痰癖壅逆於骨髓之上而為

痞滿刺痛等症，多因七情飲食，鬱為濕熱，成痰與積，初起宜辛溫開鬱，行氣豁痰，消積久則宜辛寒降火以除根。

帶膈痞滿滯下秘

氣滯上膈為嘔咳痞滿，枳橘湯枳梗湯，橘皮一物湯，枳實非白湯，沉香降氣湯。

古方附湯濕熱者，清膈蒼朮丸實熱者，解毒湯加知母枳壳痰火者，依妻實丸食積者，枳朮丸加木香二錢。○氣滯

下焦為腰痛脹墜者，七氣湯加橘核或木香勻氣散吞青娥丸便閉者，四磨湯木香順氣丸木香檳榔丸。

滯中刺痛或迴身

氣滯於中則心腹脇肋刺痛伏梁痞塊，者神保丸一塊氣丸木香分氣丸阿魏

氣丸古和巴丸濕熱古更連丸更連施石洗。○氣滯於外則迴身刺痛，氣飲子主之或手足浮腫者，三和散合

五苓散或五皮散加桂青木香丸

散火破氣雖古法

古法散火之法必先破氣氣降則火自降

矣但枳壳青皮破滯要藥，多服損入真氣虛者慎之，養血補虛同婦人

男子更勞失血及婦人產

月後因氣者，四物湯加木香檳榔陰虛氣滯者，去木檳榔加玄參黃柏或山桅一味入姜汁煎服開五臟結益少

陰血其氣。有婦人平時性急。適月事不行。氣填胸膈。嘔惡。全不入食。食則吐痰。或有一塊空。曾喉而痛。或一塊紫。如紫。心下疼痛。或腹中塊物。動作。攻刺腰背。時發開。就四。虛乏。力脚不能行。小便白濁。帶下。日就瘦弱。全似。庫。若穀食不入。甜。喜果子雜物。者乃有孕也。產前安胎。產後調氣。俱以四物湯主之。○通用二陳湯。上焦氣滯。加枳椇。香附。砂仁。中焦加厚朴。枳實。三稜。莪朮。下焦加青皮。木香。檳榔。因怒者。加山梔。香附。痞滿。加黃連。枳實。痰盛。加瓜蒌。臨痛。加青皮。柴胡。芍藥。草。刺痛。加枳殼。氣實。加烏藥。香附。氣虛。加參。朮。木香。喜動。火。加黃連。怒動。肝火。加柴胡。思動。脾火。加芍藥。悲動。肺火。加黃芩。恐動。腎火。加黃柏。成。鬱不。解者。煎吞。交感丹。

血類

吐血 此即諸血特

吐血 屬胃 審陰陽 陽盛身熱 陰盛涼 內傷外感及飲食房勞墜悶五臟有傷血

聚腸間從胃脘出者則為嘔吐從鼻出者則為衄陽盛身熱多渴陰盛身涼不渴然血陰也身涼者易愈陽多

積熱并怒火

陽盛多因飲食辛熱傷於肺胃嘔吐出血大上

膿血若名肺疽桔梗湯○大怒氣逆上衝暴甚者四物湯

加蘇子陳皮沈香童便或茅根煎湯磨沈香服之若血聚

滿膈間則吐者蘇子降氣湯加入參阿膠或暴吐紫黑成

塊者瘀血也雖多亦不妨四物湯合解毒湯調之覺胃中

氣寒者桃仁承氣湯下之五志

火動熱者解鬱湯虛者保

為心力暴勞傷

陰盛多

傷氣吐血鮮紅心脈絞痛自汗者四君子湯加黃芪柴胡

山藥百合前胡姜棗煎服或用蓮心糯米等分為末溫酒

下○勞傷氣虛按寒陰陽不相為字血亦錯行所謂陽虛

陰必走者是也外症必有虛冷之狀法當溫中使血自歸

經絡如胃虛不能化食其氣逆上吐衄者理中湯加木香

胃寒不能約血者甘草乾姜湯或七氣湯加川芎自汗者

小建中湯古桂附湯下虛極而氣壅喘欬血不歸元者黑

錫丹金液丹○勞力傷肺唾內有血咽喉不利者鷄蘇散

交心脾脈破血若湧泉口鼻俱出者不治

能統血反上令人煩悶倦怠者茯苓補心湯歸脾湯古方

血多必茯苓神為佐者心主血故也○思色強力入

房勞傷心腎陰虛火動者加戒四物湯凡血越上竅皆是

陽盛陰虛有升無降俱宜補陰抑陽氣降

月血自歸經矣陰盛陽虛者間有之耳先痰帶血皆痰

熱先痰嗽後見血多痰火積熱化痰降火為急不可純用

血藥恐泥痰也○中施吐黃湯○痰帶血者多胃中清血

熱蒸而出重者先見血後痰嗽多陰虛

山施輕者監實先血後痰虛火倡火動四物湯加貝母天

花粉化痰山施牡丹皮麥門冬降火蓋

吐血火病也雖挾痰者亦只治火則止陽熱涼血與行氣

陰虛補滋白歸藏凡血不可單行單止蓋血來未多必有

血熱則行宜苦寒涼血為君辛味行氣開鬱為臣升提俾

復其位為佐酸澀止塞其源甘溫收補其後○涼血犀角

地黃湯黃連鮮毒湯陶氏生地○葵連湯四生丸○行氣枳

梗湯二陳湯枳橘湯古烏附湯○滋補血虛加戒四物湯

○

○

○

昏暈古言歸湯氣虛單人參湯扶脾生肌散清肺生肌飲
虛甚者十全大補湯○止瀝古參柏耑狗膽丸單京墨丸
或單用炒乾姜為末童便調服善能止血降火○久者升
提三黃補血湯斷根天門冬丸大阿膠丸女貞丹○還血
歸元參苓白朮散四君子湯腎氣丸瓊玉膏○抑論血疾
陰火誤用陽燥熱藥則血枯瘦怯癆瘵成矣勞傷誤用寒
藥則胃滿膈痛血愈鬱矣墜墮隨到誤行補瀝則瘀蓄於
胃心下脹滿食入即吐名曰血道古法以二陳湯去茯苓
甘草加赤芍等分投之
此血疾難調最宜斟酌

嘔血

嘔血與吐無大異

成益無聲者為吐
成碗有聲者為嘔

怒火暴甚不可當

逆甚血溢口鼻當抑怒急陰
熱者解鬱湯虛者保命散

氣壅發熱咽喉痛

井枯湯加
參芪歸地

計或單黃柏蜜灸為末麥門冬煎湯下
煎芥黃柏水煎入童便非汁姜汁替金少

血虛熱熾滋降

良二加減四物一
湯主之一

衄血

衄血熱溢肺與胃

肺竅於鼻鼻通於腦血上溢於腦又行
清道所以從鼻而出兼以陽明熱鬱上

行則口鼻俱出大熱衄血者用萱草
去根搗汁一盞生薑汁半盞和勻服
涼血行血治同古人

方初宜黃芩湯加鬱金或茅花冬青子止之久宜清肺生
肺飲茜梅九古天地膠有醫者古蒺藜散因鼻流血久

成衄者防風散或犀角地黃湯凡初衄不可遷止去多恐
量急用百草霜末三錢水調服仍取一捻吹鼻中或用人

中白末湯調服更加髮灰一錢麝一字仍用少許搗鼻立
止或將患人頭髮分開井水濕紙頂上搭之亦好如鼻乾

燥以麻油滴入潤之如吐衄太甚不止防其血暈用茅根
燒烟將醅酒之令鼻嗅氣以遏其勢或葛然以水噴面使

諸般血藥不能正
九竅出血者亦如止後隨症虛實調之

必熱氣鬱血無藏
來血散火藥不効者古法
等散燥者單天門冬膏

嗽唾咯

嗽痰帶血本脾經
虛者六君子湯加桑白皮黃芩枳
壳五味子有火者加葶藶散有咳

肺經
火升痰盛身熱者龍腦雞蘇丸
降火湯古百花香黃連阿膠丸
虛者二陳等

歸湯八物湯或二陳湯加
母阿膠生地山梔蓋蘇桂枝能治上焦故也愈後調理玄

霜膏咳血咽
血隨唾出自腎來
火湯痰血聚肺火相煽

帶中紅絲乃
是肺癆難治
咯出血癆為
咯血或帶紅絲細如線
有血

下咯不出者其咯則有之者此精血竭也
姜汁童便青黛或聖餅子地黃膏蓄血在上閉塞清道喜

忘者犀角
此是肺腎真臟傷滋陰降火非偏見

○ 溺血

溺血純血全不痛

血從精竅中來乃心移熱小腸四物湯加山梔麥連單麥灰散入麝半釐淡苦

酒湯下單苦實

藥飲單琥珀散

暴熱實熱利之宜

煎服實熱者山梔一味水

當歸下之或

小劑飲子後以四物湯加

山梔調之心經

熱者藥赤散暑熱者益元散升麻煎湯下或五苓散

虛

損房勞兼日久

滋陰補腎更無疑

久虛者四物湯加山梔牛膝或單牛膝膏宏勞

傷精火動溺血者

膠艾四物湯腎氣丸小兒絲子丸虛甚

病久者鹿角膠丸

秋石固真丸金櫻膏痛不可忍者單豆

豉一撮煎湯溫服其効此疾日

久中乾非清心靜養不可救也

○ 便血

便血須先分內外

自外感得者曰腸風隨感隨見所以色鮮多在糞前自太腸氣分來也自內傷

得者曰膿毒積久乃來所以色黯多在糞後自小便血分
來也又有不拘糞前後來者氣血俱病也皆因七情六淫
飲食不節起居不時或坐臥濕地或醉飽行房或生冷停
寒或酒麪積熱以致榮血失道滲入太腸經曰結陰便血
一陰結一升二陰結二升三陰結三升蓋邪犯五臟則三
陰脈絡不和而結聚血因停滯溢則滲入太腸陰非陰寒
之謂也針經云陽絡傷則血外溢而吐衄陰絡傷則血內溢而便溺
風清熱紅甚則烏寒黯

毒濁濕不痛

此屬外感風者色青或紅下清血實者入參
敗毒散加槐花荆芥犀角不燥金正氣散久

虛者胃風湯古樗參散甘參丸結毒丹○熱者鮮紅用黃
芩秦艽槐角升麻青黛等分水煎服酒蒸黃連丸香連丸
蒼地丸龜板丸按風者職頭丸暑月東道香茹散熱甚則
黑者解毒湯合四物湯加大黃有瘀血者莖仁承氣湯○
寒者色黯平胃散合理中湯加葛根升麻益智神麴當歸
地榆姜棗煎服○毒者病邪蘊久色濁後重痔墜四物湯
加木香檳榔或四味香連丸○濕者直
來不痛白柏丸濕熱者古通亮丸
濕癖血箭最難除

原因傷風犯胃，痰涎久而濕毒成癰，注於大腸，傳於少陰，各日腸癖，俗呼血痢，因其便血，痢出有力，如箭射之遠也。又有如飾四散，滿下者，初起濕熱，或發於長夏者，當歸和血散涼血地黃湯加木香檳榔，久而色紫黑者，濕毒甚也。升陽除濕和血湯，外陽黃湯或補中益氣湯去柴陳，加木連川芎槐角根壳。

內傷食積糟粕，內傷飲食腹必脹，補糟粕與血同來，平胃散加槐角根壳，當歸烏梅甘草，或通玄二八丹，虛者六君子湯加芎歸行。

變或六勞傷氣陷鬱悶拘，內傷勞傷元氣下陷者，補中益氣湯脫肛者，榆砂湯。○內傷中

氣虛弱者，四君子湯或單人參湯加炒乾姜少許。古卷補散古烏荊丸，剪紅丸陽虛甚者，附丹。○內傷陰虛血弱

者，四物湯加乾姜龜板丸活龜丸腎氣丸。○內傷脾絡下血者，古連壳丸，虛者十全大補湯主之。○內傷憂思怔忡

少寐有汗者，歸脾湯或寒熱脇痛小腹悶墜拘急者，逍遙散六君子湯俱加柴胡川芎或木香少許。○已上並兼前俱

加吳萸，更兼後俱加黃連二味，須用熱湯同浸，拌濕再煎，滾湯半日，久令藥氣相和，方炒各棟出，若生則偏寒偏熱。

初起和血祛風濕

常歸和血散或赤血地黃湯實者槐花

以離九○通用四物湯祛風加栢葉防風荆芥秦艽槐花

蠟皮黃芩地榆枳殼甘草文者加升麻柴胡提之解毒加

槐花栢葉荆芥枳殼赤芍連近血加橫櫚枳實槐花條芩瀉

木腸火遠血加木通吳黃炒黃連瀉小腸火熱者加山梔

槐花黃芩大下不止加血見愁少許薑汁和服虛者加炒

乾姜濕熱加蒼朮秦艽黃芩芍藥枳殼加香附枳殼或單

香附九又古芳婦湯調血上品熱加茯苓槐花冷加茯苓

木香凡大小便血俱不可純用藥宜辛味為佐兼升舉

及酒炒藥○婦人胎前患者古芳木湯古芳婦湯六一散

三方合服產後患者補中益氣湯加吳黃黃連或八物湯

隨症選用久只補脾瀉劑俱補劑補中益氣湯參苓白朮散厚

朴煎蓋精氣血皆生於穀氣胃氣

一復血自循軌○不受補者宜瀉劑香梅九腸風黑散單

方糞前酸石榴皮為末一錢荔枝煎湯下糞後艾葉為末

生薑汁下或乾柿燒灰為末米飲下亦好○抑苦腸風臟

毒血自腸臟中來血痔之血肛門傍生小瘻射如血線未

入明卷四

肝門既脫，腐血侵淫，化為虫，蠱蝕傷腸口，滴血淋瀝，當以
益黃艾葉苦練根等化虫，或燒鰻鱗骨，薰之內，服黑玉丹。

△痰類

○喘

喘急先分肺實虛。呼吸急促者，謂之喘。喉中有響聲者，謂
之喘。虛者，氣乏身涼，痰如米實者，氣

壯，胃滿身熱，便硬。其次當知有火無。經曰：諸逆衝上，皆屬火。虛火，
宜滋補降氣實火，宜清肺瀉

胃火。炎得食喘暫止。火炎肺胃喘者，乍進乍退，得食則墜，
下稠痰則止。食已入胃，反助火痰上

喘，反大作。宜降火清金，導痰湯加麥連山梅。痰喘喉似水，
杏仁瓜蒌茹胃有實火，瀉上稠痰，散導水丸。

雞吹。痰喘必有痰聲，風痰千縉湯，或合導痰湯。痰氣蘇子
降氣湯，四磨湯，食積濕痰，古二母散，神保丸，大羅皂。

九七情氣急無聲響。驚憂氣鬱，惕惕悶悶，引息鼻張，氣喘
呼吸急促而無痰聲者，四七湯，枳梗。

湯分氣紫蘇飲四磨湯
因服補藥喘者三拗湯

外感裏遠只氣粗

外感表邪裏實不受則氣

逆上詳見傷寒○尋常感冒風寒相干肺脹逆而喘者隨
時令祛散風喘金沸草散麻黃杏仁飲寒喘加減三拗湯

藿香正氣散加五味子杏仁或蘇沈九寶

水喘怔忡或腫

飲暑自香暑湯熱症小柴胡湯涼膈散

脹水喘水氣轉有聲怔忡者小青龍湯古葶藶散白前
湯○水腫水氣脹肺而喘然喘必生腫脹必生喘二症

相因皆小便不利肺主氣先喘而後腫者宜清金降火而
行水次之脾主濕先脹而後喘者宜燥脾行水而清金次

之已上諸喘皆有除陰虛火從臍下起

陰虛喘者血虛則陽無所依附而上

奔宜四物湯加芍藥加入參五味子以水之有小腹下火
起衝上而喘者宜降心火補真陰四物二陳湯加知柏枳

壳黃氣短不能續呼吸久病氣短不能持續似喘非喘者
參人參湯扶脾生精散調中益氣

湯勞涉過者香參散飲食熱者葶藶散痰阻短氣者導
痰湯溫陰在上清陽陷下咳嗽嘔吐者加味瀉白散腎

冷元氣不能納

下元虛令腎氣不得歸元者九味安腎丸

身冷神擡肩擡肚胃衰乎

胃虛極則氣上逆擡肩擡肚生

加胡椒救之○仲景云髮汗如油汗出如珠不流擡肩

擡肚喘而不休及胃前高起脉絡散張手足厥冷脉散及

數者皆死但婦人喘病尤亟產後榮

竭衛氣無依獨聚於肺發喘者死速未發扶正治其本

補血氣虛補氣兼以已發辟邪痰火踈喘非風寒乘肺則

清金降火順氣化痰已發辟邪痰火踈喘火脹肺風寒祛

散痰火踈蘊但火急甚者亦不可純苦藥宜溫以劫之用

椒目五七錢為末姜湯下喘止後因痰治痰因火治火諸

喘不止者小蘿皂丸定息餅子含奇丸定喘化痰散久者

人參清肺飲倍粟壳瀝之○抑者內經云夜行喘出於腎

滋氣病肺有所墮恐喘出於肝淫氣害脾有所驚恐喘出

於肺淫氣傷心渡水跌仆喘出於腎淫氣損肝又云邪入

六腑身熱喘呼不得卧此

喘之名同而所感各異耳

哮喘即痰喘甚而常發者

哮喘促喉中痰作聲吐法必須量體行體實者用紫金丹二

止服二三丸則不吐臨發時用此劫之丹溪方去豆豉更妙一法用二陳湯加蒼朮黃芩下小胃丹體虛者吐下俱

忌須帶挾水挾氣須帶表為痰宜金沸草散小青龍湯倍

防已或古葶藶散道水丸有寒包熱者麻黃湯加枳梗紫蘇半夏黃芩有風痰者千禧湯或用鴉子一枚畧敲壳拍

勿令膜破放尿缸中三日夜取煮食之妙并根扶正金宜

凡哮喘急忌燥藥亦不宜寒須常帶表欲斷根者必先從滋味然後服清肺金扶正氣之劑如

清定喘湯黃芩利膈丸是也遇厚味發者清金丸久不得

惡心

哮喘者煎鈴丸單方貓兒頭骨燻灰酒調服二三錢一服即止

惡心欲吐不得吐

一見飲食心便惡

二陳湯加白豆蔻香附砂仁

不渴

胃虛與胃寒

胃寒理中湯加陳皮半夏生薑各等分胃虛六君子湯加砂仁枳實加薑汁炒黃連少許

煩渴胃家痰火聚

痰或著者大小半夏湯火盛者二陳湯加薑汁炒芩連加暈惡心治同

嘈雜

心嘈似饑又煩雜

似饑非饑似痛非痛或兼噯氣痞滿惡心嘔至胃脘作痛乃飢逆者胃之由也

縱食多愛痰火合

食鬱者枳木丸加山查麥芽有熱更加芩連停飲者變木丸胃滿者太安丸保

和丸○憂鬱者越婢丸

香連丹濕痰氣鬱不喜食者三補丸加蒼朮倍香附索食者三聖丸○痰因火動者治痰為

先二陳湯加姜汁炒芩連

山梔為君南星半夏為佐熱多

加青礬石

火動其痰者二陳湯加姜炒芩連山梔火鬱更

加撫芎藭木痰火

五更噯者思慮傷血分稍壓宜補接物

俱虛者祛痰火丸

五更噯者思慮傷血分稍壓宜補接物

湯加香附貝母
山梔黃連甘草

噯氣

噯轉食氣名噯氣有痰有火滯於胃
胃中鬱火膈上稠痰飲食鬱成宜祛痰火

九潤下丸
古黃連丸
實噯食罷噯方
氣盛實噯食罷噯轉多傷食濕熱所

致一二陳湯加蒼朮神麴麥
芽姜炒黃連或保和丸
噯濁氣填胃
不因飲食常

胃有濁氣膈有濕痰俱能發噯
六君子湯加藿香烏梅厚
朴蘇子為臣吳黃為使
久者勻氣丸或蘇合香丸甚若靈

砂以鎮
墜之

嘔吐

嘔吐須知胃冷熱
大槩肥白肉浮多寒濕瘦黑骨露多燥熱更參脉症
○胃冷面青手足厥食久

乃吐二陳湯加姜桂甚加丁附或丁香半夏丸○胃熱面
 紅手足熱食已即吐二陳湯加姜炒芩連山梔暴甚加
 檳榔木香胃口痛加姜汁或葛根竹茹湯加味橘皮竹茹
 湯或小柴胡湯加竹茹如時常口吐清水冷涎自下湧上
 者此脾熱所致也二陳湯加白朮白芍升麻炒次分三焦
 芩連山梔神麴麥芽乾生薑等分或丸或煎服

有妙括眩暈不食氣上攻上焦吐者氣衝胃脘痛食已暴吐而渴治當降氣和中六君子湯

加木香藿香桔梗枳椇葉或七氣湯熱氣衝者古刺黃湯加入參甘草檳榔胃滿酸悶食作孽

中焦吐者食積與氣或先吐而後痛或先痛而後吐治當以木香檳榔等分爲末調服行氣素沈丸消積尋常平胃散

散二陳湯加青皮砂仁厥冷下焦停有寒下焦吐者寒也朝食暮吐暮食

白豆蔻山查神麴調之朝吐久則小便清利大便不通乃陰氣偏結不與陽和治當溫其寒而通其秘復以中焦藥和之附子理中湯木香

勻氣散合理中湯四逆湯丁胡三建陽古丁半湯養正丹古半硫丸三陽熱壅大便結嘔家不可

下者常也如喜冷煩渴胃滿腹痛甚而大便秘者
大小腸膀胱結也熱者大柴胡湯下之虛者潤之
痰火不

已水怔忡
嘔吐痰火為多二陳湯加姜炒芩連或單人中白姜
湯主之肝火出胃者單黃連九或單人中白姜

汁化服脾經濕痰鬱滯上中二焦時時惡心吐出清水或
如豆汁者胃寒湯加半夏檳榔水嘔心下怔忡先喝後

嘔者茯苓湯先嘔後治者
猪苓湯水入即吐者五苓散
肚腹黃心多痰血
暈氣脹氣

嘔吐難以延血此脾血不
治膿盡自愈四物湯
赤茯苓牡丹皮
虛者八珍湯加陳

皮
客風翻翻暑渴
風邪在胃翻翻不定或
入食積不消金正氣散
麥天湯安脾

丸不宜輕用參朮補任邪氣反甚惟名病助痛者木
也方取用六君子湯加青皮為藥果胡升麻川芎砂仁神

變治不熱者小柴胡湯加青黛姜汁蒸餅為丸服○暑吐
煩渴黃連香茹散六一散加砂仁或枇杷葉散錢氏白朮

散
氣虛痞滿而痛切
久病胃氣虛弱全不納食聞食氣則
嘔者四味養榮湯或四君子湯去茯苓

卷四
考加香附參茸胃痞短氣者調中益氣湯胃虛寒痰作嘔
者增半湯○重吐時常惡心胃口作痛口吐清水得食暫
止饑則甚者胃中有蛔也○陳湯加苦楝根史君子白朮
烏梅或用錫灰檳榔等分米飲調服亦可凡吐如清菜汁
者死此是乍然嘔吐非翻胃比也○又舟
暈木吐渴飲水者多死惟童便飲之最妙

飢逆

飢逆分不足有餘

不足因內傷脾胃及本病後胃弱多面
青腹冷便軟有餘因外感胃燥及太怒

大飽多面紅肢熱便閉
有餘可治不足者危

不足火炎陰氣虛

火乃元氣之賊
人之陰氣依胃

氣而養胃土受傷則木氣侵之陰火所乘不得內守木挾
相火直衝清道而上乃風之甚也○膏粱濕熱者十味小
柴胡湯吞單黃柏丸或調益元散胃火善食者小半再湯
加山梔黃芩吐之○火盛者益元散加黃連黃柏自利更加
參朮白芍陳皮○久病滯下及婦人產後從臍下逆勞復
上夜分轉甚者皆屬陰虛四物湯加知柏陳皮竹茹

貧者太勞火動獨升清陷者補中益氣湯或

有比合生脉散加黃和附子少許挾房勞者瓊玉

膏有氣不歸元久病寒持火為事金必死凡傷寒吐下及

難病久每飽逆者皆火欲上行為胃中寒邪所遏故搏而

有聲俱宜下香柿蒂散是治附子湯理中湯倍參久者三

香散或木瓜根煎湯咽之申虛有餘飽食胃中失升降陳

胃脈結者灸其草湯救之痰鬱何由得痰子發飽從胃中起者今連二陳

湯或只厚皮半夏姜煎服或人參蘆前湯吐之停痰或因

急聲痰熱者亦宜蓋參蘆前湯肺肺衰氣降而次上復位矣

七情氣鬱者木香勻氣散陽症失下多潮熱地道不通

用蘿蔔煎湯下蘇子降氣湯宜寒藥下之太柴胡湯陽極脉微壯脫者

宜涼膈散解毒湯養陰退陽不可大下汗吐下後胃熱

未除小柴胡加橘皮竹茹或有餘湧吐泄平人食物太速

橘皮竹茹湯單瀉心湯飲米入肺毒矣

太多亦屬有餘食飽笑飽以紙撚鼻噎或久閉氣可止
○水飽小腸胃湯小青龍湯去麻黃清之利之而已
足補補有溫平涼莫拘凡汗吐下服涼藥過多者當溫補
宜涼補肩方率用丁附溫煖助火損
不足而益有餘宜乎飽逆之必死也

○膈噎

三焦枯槁成膈噎飲食不下而大便不通名膈噎疏云膈

太便不通通幽湯故以膈噎為通肩方以噎近咽膈近胃
而遺下焦又妄分十膈五噎皆非經旨病因內傷憂鬱不
志及飲食滯鬱而動脾胃肝腎之久或因雜病誤服辛香
燥藥俱令血氣衰耗胃脘枯槁其槁在上焦實所者食不
能下下則胃脘當心而痛須臾吐出乃止實門即胃脘上
口言水穀自此奔入於胃而氣則傳之於肺也其槁在中
焦幽門者食物可下良久復出幽門與中脘相近言其位
幽微胃中水穀自此而入小腸也其槁在下焦闌門者朝

食暮吐暮食朝吐闌門臍下爛約水穀分入膀胱太腸而為糞溺是大小腸膀胱乃氣血津液流通之道路也陽

火上升有虛熱經曰三陽結謂之臍小腸熱結則血脈燥

三陽熱結必共數有力前後閉塞下既不通必反而上行所以噎食不下縱下復出乃陽火上行而不下降也○

實火黃連解毒湯加童便姜汁或益元散入姜汁澄白脚為小丸時時服之溫六九尤妙甚者陶氏六一承氣湯人

參利腰丸雷火衝上食不入者枳梗二陳湯加厚朴白朮及木香少許或古更連花湯者錢氏白朮散大便閉者

導滯通幽湯或參仁九麻子仁九當噎未至於臍之時便宜服此防之膏肓之疾豈可忽忽○間有身受寒氣口傷

冷物以脾胃火衰臍上苦冷腸鳴脉必滑微宜暫用丁香煮散五膈湯五噎湯單附子散以劫之若不求其本偏認

為寒藥用辛香燥藥必至燥陰不救**為痰為積本七情**古云膈壹神思間病

火起薰蒸津液為痰為積積久則血愈衰針經曰怒氣所至食則氣逆不下勞氣所至為膈噎喘促思氣所至為中

卷三焦閉塞咽嗑不利。○痰飲脉滑或伏。二陳湯古參夏
湯化痰丸。瓜蒌實丸。或用黃連吳萸貝母瓜蒌仁牛膝草
水煎。○食積脉滑而短。枳實丸。加黃連。皮半夏。或狗米
平胃丸。虎脂平胃丸。或用保赤丸。二錢。於姜炒黃連二錢。
山查二錢。為丸。麻仁大腹脂為衣。每六十九人參煎湯入。
竹瀝下。○七情鬱結脉沈而滑。飲食喜靜。胃背癰者。四七
湯。濕滯。痰痞滿。煩悶微嗽。二便不利者。分心氣飲。四磨湯
或木香檳榔二味等分。為末。白湯下。傷神不睡者。十味溫
膽湯。硃砂安神丸。腹脹喘急者。木香勻氣散。有
積聚者。阿膠。薑黃丸。惡聞食氣者。五膈寬中散。

氣血兩虛

多口沫

無力。四君子湯。太便秘閉。加薑根童便。氣虛甚者。六

君子湯加附子。大黃。酒毒。加其蘇汁。單人參。湯人參膏。元
妙。○血虛不能滋潤。生火者。脉必數。而無力。四物湯加童
便。竹瀝。姜汁。太便秘閉。加桃仁。紅花。有瘀血。加牡丹皮。非汁。
防生蟲。加驢尿。血虛甚。加乾姜。血燥。加牛羊乳。汁不可。以
人乳代。之。蓋人乳。反有七情飲食之毒。
火故也。○氣血俱虛者。八物湯主之。

金水二臟須扶持

血氣主靜，內外兩靜則臟腑之火不逆而金水二氣有養，陰血自生津液傳化，合宜何隔壅之有？腎氣凡主之益。

陰表腎是總訣

不問虛實俱以益陰養胃為主，庶免後患。通用二陳湯加童便、竹瀝、姜汁、韭汁，有

熱加土炒蒼朮、蓮心、蔓結、梗、七情加香附、川芎、木香、檳榔、不
納食加麥芽、神麴、熱結食逆上奔加大黃、桃仁、氣虛合四
君子湯、血虛合四物湯、○雜方：燒針丸、枳殼丸、紫金錠、霞
天膏、神仙膏、金丹、古附翼散、或靈砂燒酒下，凡五十歲後
血枯、糞如羊屎及年少不發、
薄飲食、斷絕房室者，不治。

關格

與臨吐關噎
諸症案看

關不利便格吐逆

經云：人迎脈大於氣口四倍名曰
氣口脈大於人迎四倍名曰關

上寒

下熱中焦窒

關乃胃不下，以寒在胃中，塞而不入，格乃陰
不上，以熱在下焦，塞而不出，上下不通，三焦

撥亂，中氣不足，陰陽不能相榮，故既關且格。○中惡者，補
中益氣湯加檳榔以升降之中，虛癆盛者，六君子湯去木

加栝子仁及麝少許虛甚

吐利俱不得者既濟丸

吐提其氣非為痰

關格與噎膈異胃中覺氣

有碍欲升不升欲降不降飲食不食宜下陳

或加木通吐其橫格之氣不必在出痰也

或浴下焦不

可執

古云關格死在旦夕但治下焦可愈經云少陽所至

得為關非格也不承氣湯下之若但吐而不得小便者

苓湯有膏瀉積熱損傷北方真水者滋腎丸主之忌用淡

滲利水之藥詳前淋症

凡關格見頭汗者死

痧

痧症虛實則剛

陽極則為剛痧多類風症宜清熱化痰祛風陰極則為柔痧多類厥症宜溫

化痧降火此升溫謂實則為剛

虛則為柔皆危症也餘詳傷寒

口噤不醒通身強

痧病發則身強

不醒癰病發則身軟時

內外因皆挾痰火

或外因風邪或內因七情皆必

扶痰火而後發症。○痰壅發症不醒或只手足搐搦左右
動搖宜祛風道痰湯加竹瀝姜汁。○風痰盛者敗毒散加
防風天麻黃芩全蝎生薑薄荷或通聖散加人參柴胡開
服青星丸姜汁竹瀝下。○火盛則遍身戰振猶火炎而旋
轉也火能燥物而使氣液不足宜因物二陳湯加麥連知
柏竹瀝童便補而散之。○實火則胃滿口噤咬牙脚攣卧
不着床大便閉者大承氣湯下之仍忌風藥蓋火
為風燥之本能治其火則風自散而燥自潤矣

發問諸

虛其則亡

七情鬱悶者為藥順氣散八味順氣散主之

血虛脫無以主時養筋此等尤不可絕用風藥經曰諸症
強直皆屬於濕濕極反兼風化則之實非風也虛也故又
有言曰虛為本痰火外邪為標氣虛者補中益氣湯加竹
瀝或六君子湯加黃芪附子柴胡血虛者四物湯加防風
羌活或大秦芩湯瘳病比瘳
更重甚則因而昏死者有之

癰

癰與顛狂相似但癰病時發時止邪
流五臟顛狂經久不愈邪全歸心

癰有陰陽只是痰

內傷最多外感極少蓋傷飲食積為痰

舍舍空痰塞丹溪云癰因痰塞心竅發則頭旋卒倒手足

搐搦口眼相引旬月背強直叫吼吐涎食頃乃醒病先身熱

脉浮在表者陽癰屬六腑易治病先身冷脉沉在裏

者陰癰屬五臟難治若神院目瞤如蠱痴者不治時師

何以知五三

癰又必歸於五臟肝癰而青搖頭喜驚作驚

利吐苦羊吼肺癰面白沫腹脹牛吼腎癰面黑直視如

尸瘡此五癰病狀偶類之耳其實痰火與驚三者而已

小兒風驚食

三癰見五卷

痰挾火與驚多

出風痰星香散加三

三枚姜煎服或追風祛痰丸五生丸驚痰此藥不散驚

九抱龍丸三癰丸引神歸台丹毒星丸因怒者順氣導痰

湯加菖蒲反砂因憂思者妙香散食痰醒脾散瘦人

火盛面赤者防風當歸飲或小調中湯加南星或滾痰丸

驚黃丸牛黃清心丸龍腦安神丸千金龍膽湯○痰火俱盛者猪心丸溫酒下上吐下利去頑痰老痰為妙○通用

斷期用活鹿丹蛇
散控涎九紫金錠

調中補元瀉東南

瀉本痰熱袪驚宜
寒藥清心降火化

痰為主故古法用二陳湯加瓜蒌南星黃連探吐吐後必
服硃砂安神九以降南方之火當歸龍薈九以平東方之
木但此痰必先順氣順氣必先調中頑痰膠固非辛溫熱
藥為佐何以開道是以古方治驚癇皆有溫劑又如錢仲
陽治小兒癇經吐瀉及服寒藥過多身冷閉目不食後用
益黃散補中能食次服腎氣九補北方腎水能語此須從
權以救瀉之壞症
亦可以為成法

顛狂

顛狂痰火閉心坐都發毒怒太無常

素問註云多事為顛
多怒為狂

屬肝二經皆火有餘之地且喜則氣散暴亢謀為不遂鬱
從不得志者多有之大藥痰迷心竅者葉氏清心九全清
鎮心九硃砂安神九心風顛者牛黃清心九追風祛痰九
生者加紫河車一具為癰瘡傷肝者寧神鎮痰湯鴻膏九

當歸龍薈丸用驚者抱膽丸驚氣丸丹溪云五志之火鬱而感成爲顛爲狂宜以人事制之如喜傷心者以怒解之以悲勝之憂傷肺者以喜勝之以怒勝之陽明熱結膏粱味陽明發狂見傷寒雜症胃與大腸實

熱燂火鬱結於中太使開者涼膈散加大黃下之○膏粱醉飽後發狂者止用鹽湯吐痰即愈或小調中湯○服芳

草石藥熱氣慄慄發狂者三黃石黃湯加黃連甘草青黛並板根或紫金錠

難經云重陰者顛重陽者狂河濶以顛狂一也皆屬痰火重陰之說非也但世意發狂一皆妄言妄語而不成久難

者又有痴迷顛倒繼久而不發狂者故取不精人只一於前難經分析於後○顛者異常也平日能言顛則然然平日

不言顛則呻吟甚則僵仆直視心常不樂此陰虛血少心火不寧太調中湯主之不時倒暈者滋陰寧神湯言語失

倫者定志丸悲哭呻吟者龍薈丸是故紙酒調一二錢華蘇仁煎湯常服可以斷根○狂者凶狂也輕則自高自是好歌

好舞甚則棄衣而走踰牆上屋又甚則披頭大叫不避水火且好殺人此心火獨盛陽氣有餘神不守舍痰火壅盛

而然小調中湯三黃丸控涎丹車苦參丸狂則專於下
痰降火顛則兼平安神養血經年心經有損者不治

言未見如神鬼邪崇由來痰作殃

視聽言動俱妄者謂之

見聞事又五色神鬼此乃氣血虛極神光不足或痰火
壅盛神氣不定非真有妖邪鬼祟大槩內服傷寒瘟疫條
人中黃丸照依氣血痰湯藥為法或單人中黃亦好服或
單石菖蒲末猪心血為丸服亦可有婦人夜夢鬼來交者
定志丸料加赤小豆水煎服有婦人月水前漏過多血氣
迷心或產後惡露上衝而言語錯亂神志不守者此血虛
神耗也宜寧神膏俱亦不可絕服補心斂神藥血熱者小
柴胡湯加生養生地煎服百餘帖即安血迷心胞喻牆上
屋歌唱無時若逍遙散加遠志桃仁紅花蘇木服後病退
用平胃散少用厚朴倍加蒼朮升麻常服以絕病根又口不
子挾痰血者蘭氏當歸汁血湯有卒中屍惡吐利如草草
亂狀或狂語如醉人有起心先知其肇或已死口噤不開
皆急用蘇寒門透魂湯灌之

外法辟邪丹並解法

驚悸怔忡健忘

驚悸惕惕不自定如入將捕曰怔忡

思慮過度及因大驚

或耳聞大聲目見異物臨危觸事便覺驚悸甚則心跳故

厥脈弦濡者虛也血虛因物湯茯苓神湯妙香散珠砂安神

丸氣血俱虛人參養榮湯養心湯時作時止者痰也二陳

湯加白朮黃連遠志竹瀝姜汁○怔忡因驚悸久而成痰

在下火在上故也溫膽湯加黃連山梔當歸貝母氣鬱者

四七湯加茯苓遠志竹瀝姜汁或十味溫膽湯金箔鎮心

丸傳飲胃中漉漉有聲快快不安者二陳

湯加茯苓檳榔麥門冬沈香或朱砂丸

又有健忘非驚

鉅精神短少痰相攻

怔忡又則健忘三症雖有淺深然皆

上以引神歸舍丹主之亦有所稟陰魄不足善忘者常大

補氣血及定志丸如老年神衰者加減固本丸○三症通

用歸脾湯仁熟散養授天

王補心丹毒星丸參藥丸

咽喉附失音骨鯁

種種咽喉總是大

咽喉氣之呼吸食之出入乃人身之門

知一左單蛾二右單蛾風形圓如小筋頭大生於咽喉關
上可治生於關下不見者難治三雙蛾風兩箇生於喉間
關下難治四蟬舌風舌下再生一舌五牙蟬風牙齦腫毒
成瘡六木舌風舌腫大如魚舌不能轉動七舌黃風
舌上腫痛黃色八魚口風口如魚口不能收水不治九塞喉風疾
痺聚毒涎唾稠實而發寒熱初起上可治關下難治十懸壺
壺毒風上腫腫水食不下形腫如雞卵十一瘡瘻風因食
鯁齧惡物發泡十二瘡癰風腮頰結腫牙齦便腫破十三
纏喉風自喉纏繞赤色寒熱十四松子風口內兩旁赤近
唇肝張口吐物則氣逆關閉飲食不能十五單砂痔口風
自舌下牙齦上腫赤口內作瘡如湯熱牙齦乾爛亦能脫
齒十六連珠風自舌下起初起一箇又起一箇甚者三五
七九箇連珠生起十七蜂子毒或在臉腮浮爛或在喉關
上下位色黃如蜂十八走注瘰癧風頸項結核五七箇

皮膚赤腫作寒熱尋常咽瘡痛者多是虛火意種類雖繁
同歸於火蓋少陰君火少陽相火二脉並絡於咽喉若火
勢盛則熱結而為瘰癧相火勢速則腫甚不仁而為痺
痺甚不通而痰塞以死矣故曰一陰一陽結謂之喉痺一
陰肝與心胞一陽少陽三焦四經皆有相火火者痰之本
痰者火之標故言火則痰在其中矣言咽喉則牙舌亦包
在其中矣火有虛實從何知實火便閉胃必緊實火因過食煎
炒蘊熱積毒煩
渴二便閉澀風痰上壅將發喉痺必先三日即服不利脉
弦而數治宜先去風痰而後解熱毒赤膈散加黃連荆芥
石膏或古荊黃湯防風通聖散三黃丸含化又風燥咽疾
乾枯常加毛刺不嚥有得敗毒散加黃芩半夏倍桔梗薄荷
荷生薑煎服痰盛加石膏凡服此藥子服午攻午服子攻
如嘔吐略傷因食熱物及穀芒刺澀風熱併煎血氣相搏
腫痛者消風散加薄荷玄參全蝎或射干湯牛蒡子湯木
舌重舌者如聖金錠舌根腫者麝香硃砂丸時行咽痛者
普濟消腫
虛火便利脉亦微虛火因飲酒則動脾火忿怒則
動肝火色慾則動腎火火火火上

攻咽腫乾燥必二便如常少陰脉微治宜補虛降火卑虛者四物湯加桔梗荆芥知母黃柏氣虛者四君子湯加其草桔梗玄參升麻甚則乾姜附子以為向導徐徐服之如痰盛者二陳湯料入青魚膽一箇其膽先以糯米入內陰乾為末姜汁調服亦可探吐或千縉湯魯服涼藥自利或聲音有壞者秘傳降氣湯救之○暴感風寒則咽喉緊縮妨礙若果梗半夏夏湯桔梗湯腎傷寒及陰症者半桂湯蜜附子○通用其桔湯利肺湯水梅左降角曉珀膏或單百草霜為末蜜丸彈子大每二十丸新汲水化服凡咽喉不可純用寒藥草藥取効目前上熱未除中寒復起毒氣乘虛入腹胃前高腫上喘下泄手足指甲青繳吐引痰具捷法紫七日以後全不入食口如魚口者死繳吐引痰具捷法繳法用青魚膽末繳三次紅腫即散○此法用冬月青魚膽以井礬入內臨用加百草霜炒盡少許醋調以鴨毛蘸藥引吐痰盡如無煎膽用白礬半斤巴豆肉十枚同煎過去已用引吐痰神効吐後用金鎖匙吹之常服其桔湯最妙如牙關緊者用後開關藥或急甚神針一發之為謂發二仙散不省人事者下字散

牙也咽者忌牙最不可誤人惟磁針出血即牙之義也血
物多則愈有封瘡者姜汁調熟水時時吸之畏針者委曲
針之凡關上血泡最宜關下不見者今病人含水一口用
簪管刺入鼻孔刺出血妙惟腎傷寒及帝中腫者忌針
用蛇床子於瓶中燒烟

令病人臥中入喉中上立愈 毒結開關還可救 雄黃解毒丸

此或用巴豆壓油紙上取油紙捲成條子點燈吹滅以烟

薰入鼻中一時口鼻涎流牙關自開一方用巴豆肉以綿

裹定隨左右塞於鼻中左右俱有左右俱塞立透蓋方

中以巴豆湯走馬喉痺者以熱攻熱熱則流通之意也喉

失音者却難醫 喉痺失音者秘傳降氣湯去陳皮加黃芩

汁潤之或桐子散血虛受熱咳嗽聲嘶者用青黛蛤粉蜜

調含化或潤肺丸蜜脂煎尋常聲音不清者加味固本丸

內傷虛損咽瘡失音者無治法○骨鯁用朴硝為末對入

龍腦雞蘇丸內為丸彈子大噉化不遇三五丸自然消化

魚骨鯁食噉覺或以核為末順流水調服

外用藥丸自下餘詳七卷急救方

虛類

發熱附惡寒

發熱原無表裏證明是內傷虛損病外感發熱人迎緊盛隨表裏見症汗下即

解惟內傷虛熱經久不解無表裏二症雖食積類傷寒初症右脈氣口緊盛身節不痛為異勞後力倦

慾昏神內傷勞後發熱脈虛而弱倦怠無力不惡寒乃胃中真陽下陷內生虛熱宜補中益氣湯○內傷色

慾發虛發熱便硬能食者滋陰降火湯中味迺迺散清生

冷鬱遏四肢甚內傷生冷鬱遏陽氣及脾虛伏火只手足心熱肌層不甚熱自汗不食者火鬱湯

晝熱口淡是陽虛凡饑飽勞役傷胃陽虛口中無味晝熱夜輕者俱宜補中益氣湯甚加附子

盛下虛者清心蓮子飲夜熱晝輕陰弱定凡房勞思恐傷腎陰虛口中有味夜熱晝輕者俱宜

因物湯加知柏黃芩甚者加重便

龜板峻補其陰有鬱抑者下甲丸陰陽兩虛熱無時陰陽

晝夜發熱煩渴不止症似白虎而無自痛鼻乾者古綿裘

湯如臟冷榮熱脈浮者人參地骨散久虛積損者八物湯

人參養榮湯甚者既濟湯去半夏加五苓子當歸地黃入

重便少許或二至丸八寶丸二神交濟丹○抑論肥人及

脈弦大無力者氣虛於血宜甘溫補氣氣旺則能生血若

瘦人及脈弦帶瀉者血虛於氣止宜苦寒為主佐以甘溫

若氣血平補依舊氣旺而陰愈消矣凡虛熱皆因精神外

馳嗜慾無厭陰氣耗散陽無所附遂至浮散肌表而發熱

實非者骨蒸傳變須防命火自佛騰肉如針刺骨熱煩疼

或五心俱熱或兩肋如火或子午相應或晝微惡寒而夜

反大熱雖腎經所主傳變不常蒸上則見喘咳痰血唇焦

舌黑耳鳴目眩等症蒸下則見遺精淋濁泄瀉腰疼脚酸

陰物自強等症蒸中則見腰膝痠痛四肢倦怠等症古云

肝症發熱肉下骨上寅卯尤甚渴者九人中白散心症發

熱在血脉日中則甚卑鴻心湯導赤散珠砂安神丸脾症

腹脹

發熱在肌肉過夜方甚黃散三白湯肺症發熱在皮

日西則甚渴白散甚者系隔散腎症發熱在骨亥子時甚

兩手足心如火滋腎丸主之太要脉弦而濡者秦丸扶歸

湯加朱消通散肺弦而數者節齋四物湯通用五蒸湯丸

二參湯香連猪肚丸大虛煩內煩不得眠乃心內煩躁無

胡連丸補腦丹大造丸

冬熱也仍分氣虛血虛或大病後津液枯竭煩而有渴者

人參門冬湯滋陰湯不眠者六一散甚加牛黃勞心者妙

香散脾弱者三挾痰挾積尤難淨挾痰發熱者二陳湯加

白湯詳見傷寒

味子挾濕痰發熱者清肺膏並丸濕熱甚者皮枯肢疼唇

燥面赤痰嗽食少味者宜量腹吐出痰涎然後服清熱

化痰開鬱之藥古方蒼朮丸蒼朮丸蒼連丸蒼芍丸選用

○積病最能發熱多夜分腹肚熱甚柴陳湯加山查麥芽

乾葛又若保和丸枳朮丸間服清胃散陰虛發熱黃白丸

勞熱食積痰者上下用丸因酒發熱者宜青黛降薑仁入

姜汁每日服數匙最妙

凡發熱人極忌飲酒

八問卷四

五

惡寒陽虛不自任

尋常外感惡寒頭痛微汗即止內傷表分衛虛惡寒者黃芪建中湯或調中益

氣湯加黃芪桂枝內傷陽虛自汗全不任風寒者四君子湯減茯苓倍加黃芪桂枝或附子如晝夜惡寒甚者單用參芪桂附峻補其陽如久病陽氣鬱陷惡寒者升麻葛根湯去芍加參附白芷草豆蔻蒼朮葱煎服

虛痰火盛

陰虛微惡寒而發熱者二陳四物湯加知母黃柏地骨皮按痰濕惡寒者宜苦參赤小豆各

一錢為末非汗調服探吐吐後以川芎南星蒼朮黃芩調九白湯下冬月去參加姜汁為丸調之○素病虛熱忽覺

惡寒須臾戰慄如喪神守乃火炎痰鬱抑遏清道不能周密腠理四物湯加黃芪黃連黃柏或合二陳湯如火起

酒淋惡寒者甘桔湯加酒芩山拖麥門冬五味子惡寒甚

燔者四物湯加大黃下之又病過服熱藥惡寒者先探吐痰後以通聖散加生地當歸或四物湯去芍倍地黃加白

木黃柏參芪甘草通山炒熱煎服如酒熱內鬱惡寒者黃一兩為根五錢煎服大汗而愈○抑者內經論陰虛因帶倦氣衰則火薰胃中而生內熱陽虛則不足衛護皮膚

而外寒陰盛則血脈不通而中寒陽盛則腠理閉塞而外
熱仲景謂陽虛陰盛宜汗散其陰邪陰虛陽盛宜下瀉其
陽邪東垣謂晝熱陽氣旺於陽分夜熱陽氣下陷陰中皆
名熱入血室重陽者晝夜俱熱夜寒陰血旺於陰分晝寒
陰氣上溢陽中重陰者晝夜俱寒丹溪謂惡熱非熱明是
虛症惡寒非寒明是火症王水謂熱之不熱是無火也當
治其心寒之不寒是無水也當治其腎噫寒熱陰陽虛實
醫家大分幸四公發明經旨善學者必合而玩之始得

汗

自汗侵侵氣虛

汗者元陽真液因飲食驚恐房勞行動
出汗者曰多汗不問昏醒朝夕侵侵出

汗者曰自汗乃陽氣不足衛護發熱者補中益氣湯加麻
黃根解小交阻升柴俱宜蜜水炒過以殺其升發之性又
欲其引參芪至肌表故不可缺也發厥者古法
附湯順元散間有氣血俱虛者黃芪建中湯
亦有痰濕

外邪初

痰症自汗頭眩嘔逆宜川芎白朮陳皮甘草水煎
服多汗身軟者濕也心主熱脾主濕濕熱相持如

地之濕熱氣為雲霧為雨各臟皆令有汗獨心與脾胃為
濕熱主耳宜調衛陽玉屏風散火炎上蒸胃濕作汗者京
腫散胃熱者二甘湯是知自汗亦有實者故外感初起亦
多自汗風症桂枝湯加附子寒症古桂附湯暑症五苓散
風濕相搏防已黃芪湯凡自汗久用參芪附子不效宜養
心血或汗乾仍熱者必外感風宜參蘇飲病止住服是反
治也盜汗全是陰分弱腎火脾濕心勞功睡著出汗醒則漸
收蓋睡則胃氣行
於裏而表虛醒則氣散於表而汗止心火炎盛以致肺失
衛讓者當歸六黃湯陰虛火動者四物湯加知柏黃氣虛
者加參芪白朮腎火動甚者正氣湯脾濕者四製白朮散
肝熱者用防風龍膽草等分為末米飲調服心虛者用人
參當歸各二錢半先用猪心血煮湯澄清以汁煎藥服思
慮過度以致心孔獨有汗出者用艾湯調下茯苓末一錢
或青桑第一番葉帶露採陰乾或焙為末米飲調服或古
芷砂散通用黃芪六一湯加浮小麥牡蠣府黃根外用五
倍子白礬為末津液封臍中一宿即止或用牡蠣麥
焚灰漬枳實本糯米防風白芷等分為末周身撲之

痿

諸痿不痛火尅肺

經曰諸痿皆生於肺熱肺熱葉焦脾弱着足痿躄色白毛枯曰皮痿五臟受之

發為諸痿悲哀失志上發喘而下瘦血乃心熱下虛也曰肺痿則脰脛筋脉縱緩而不能任用於地思色無窮或入房太甚口苦白淫乃肝熱膽津滲也曰節痿則筋脉乾急蹠蹠居處卑濕肉蠕動而口渴乃脾熱胃燥也曰肉痿則肌肉麻木不仁有所勞行大熱而渴則陽氣內伐熱舍於腎水不勝火骨髓空虛色黑齒搖各曰骨痿則腰膝痠痛不能舉骨痿不能起於床者死

肺傷木旺肢體廢

肺被火傷則水寒是而傷土則脾亦為之傷矣

肺傷則不能管攝一身脾傷則不能運用四肢而痿廢矣五痿總屬陽明陽明者宗筋之會也陽明實則宗筋潤而機關利矣

馮南補北是大經

馮南則肺金清而東方不旺脾不傷而宗筋潤矣補北則心火降而西方不虛肺不焦而榮衛通矣清燥湯虎潛丸腎氣丸調和金水二臟治痿之大經也

慎勿滾同風

痺治痺乃風寒濕合脚氣寒濕而成緩風邪深手足肢

因外感宜發散痿屬內傷補血氣血虛者四物湯合生膠

補陰九氣虛者四君子湯加蒼朮黃柏黃芩下鹿茸四片

九却五味子或五獸三寶丹又有瘀血妨礙者四物湯加

參朮黃柏紅花或兼濕熱或兼痰有濕多者有熱多者有濕熱相

起於手足之內者二陳湯加蒼朮又恐食積妨礙陽明滯味

木黃柏白朮黃芩竹瀝姜汁清燥湯如食全五痿旺時病易安

少者白朮膏獨活寄生湯挾風者天產作陽戒厚味助火發熱故也素

木秦艽湯何首烏丸順氣丸

○厥與麻木條系看

厥症不獨手足厥宗筋脾胃合為尊

內經氣厥篇厥者氣逆也凡移寒移熱或

伏熱深而振慄或虛寒甚而發躁皆謂之厥不微手足厥冷而日宗筋陰器也厥陰所主脾胃肺皆輔逆宗筋寒厥則陰縮而四肢冷熱厥則津乾不榮四肢謂赤而手足熱是六經之厥皆統於肝與脾胃也

太陽

足難行

經曰巨陽之厥腫首頭重足不能行發為聾仆而僵仆倒地

陽明腹滿顛狂

陽明之厥則熱疾欲走呼腹滿不得卧面赤而熱妄見而妄言

少陽耳聾脇肋疼

少陽之厥則暴

聾頰腫而熱脇痛脈不可以運

太陰腹脹作嘔吐

太陰之厥則腹滿腹脹後不利不欲食食則嘔

不得少陰心痛口舌乾

少陰之厥則口乾溺赤腹滿心痛

厥陰莖縮膝腰

折厥陰之厥則小腹腫痛腹脹溼洩

又或咽腫或不安腸

折厥陰之厥則小腹腫痛腹脹溼洩

癰項強衄吐血

太陽厥逆僵仆嘔血善衄少陽厥逆机關不利發關不利若腰不可以行項不可以

顧發腸癰不治驚者死陽明厥逆喘咳身熱善驚衄嘔血
手太陰厥逆虛滿而咳善嘔沫手心主少陰厥逆心痛引
膝身熱死不可治手太陽厥逆耳聾流汗出頭不可治
不可治俛仰手陽明少陽厥逆發喉痺瞤腫痊若三陰俱
逆不得前後使人手足寒三日死

外感寒泣暑相煎

寒泣血發厥脉沈微者理中湯四逆湯暑

耗氣發厥脉虛者白虎湯或香薷散加羌活夏月勞役犯
房以致陽氣煩擾目盲耳閉內經謂之前厥言熱氣煎逼
損腎與膀胱而成也宜四君子湯加遠志防風赤芍內傷
交閉冬陳皮凡外感發熱者宜解散藥中加姜汁

薄厥痰火挾

內因喜怒傷氣傷志氣逆而不下行則血實於心胃內經謂之薄厥言陰陽相薄氣血奔

井而成古法暴厥氣逆身冷者蘇合香丸八味順氣散怒
氣逆甚嘔血熱衄發厥者四物湯去地黃加赤茯苓人參
桔梗陳皮麥門冬檳榔姜煎服或六磨湯氣實多怒忽大
叫發厥者乃痰閉於上起火起於下而上衝用香附五錢川
芩七錢生甘草三錢童便姜汁煎服又青黛人中白香附
為丸用酒送下愈用藥痰渴加黃連香附煎吞當歸龍膏丸因

勞役飲水被驚發厥者六君子湯加參連竹瀝姜汁○內傷痰火發厥脉弦滑者二陳湯加竹瀝枳實加生附子按火加參連山拖竹瀝肥人加入參姜汁凡厥症為多厥為助仆為妄見或腹脹二使不利或嘔或心痛皆痰火鬱氣病也

總因酒色陰陽衰

熱厥因醉飽入房濕熱鬱於脾土不能滲榮四肢陽氣獨盛故手足心熱

宜補中益氣湯升陽散火湯火鬱湯○寒厥因多慾奪精元陽大有折損不能滲營經絡陰氣獨在故手足皆寒宜十全大補湯加附子或當歸四逆湯○尋常氣虛發厥者曰君子湯血虛發厥者四物湯有火加知母黃柏虛寒加附子但厥多不以正勝乘其所勝如腎移寒於脾則為寒厥心移熱於腎則為熱厥六經皆然抑論陽症煩渴譫語身熱陰症不渴靜倦身寒與傷寒陽厥陰厥大同但雜病多因酒色七情痰火所致外感者少故經曰陽衰於上則為寒厥陰衰於下則為熱厥陽極以陰陰極以陽與傷寒因雖不同而病狀變化亦相似也

下虛撥

凡有吊死問疾或入廟登塚卒中外邪與臟氣相忤氣遏不行經絡脉伏昏不知人忽手足逆冷頭

面青黑牙關緊急昏暈卒倒或錯言妄語決不可作風治
 先宜蘇合香丸灌之候醒以木香勻氣散合平胃散調之
 素靈者用焰硝五錢硫黃二錢為末作三服用陳酒一盞
 煎服焰硝更傾於盞內蓋着溫服如人行五里又進一服
 如無前藥用古參附湯入姜汁酒煎服外灸百會穴如葉
 豆大艾九壯氣海百壯身溫者生暴死者追魂湯灌之○
 蛇厥見傷寒接補陰陽本內經陰陽氣不相接則厥熱厥
 血厥見產後接補陰陽本內經補陰寒厥補陽正經所謂
 壯水之主以真陽光益吐下還為實者設以蘇合香丸灌
 火之源以消陰翳也
 亦可熱甚者大承氣湯雙解散下之

癆瘵

癆瘵日瘵先須辨陰陽熱瘵陽病口乾舌蒼咽痛涕唾稠
 粘手足心煩疼小便黃赤大便燥

熱瘵陰病嘔痰白色胃逆口惡飲食難化小便多遺精
 白濁大便溏泄又有嗽痰伸屈不行者必陰陽兼病也多

因十五六歲或二十前後血氣未定之時酒色虧損精液而成全屬陰虛間有因外感夕瘧久嗽而成者多屬陽虛熱病咽瘡失音者死陰陽傳變最無常久皆能傳變男子虛癆泄不止者死自腎傳心肺肝脾女子自心傳肺肝脾腎五臟復傳六腑而死亦有始終只傳一經者有專着心腎而不傳者太要以此脈為潮汗咳或見血泄分輕重輕者六症間作重者六症并發為血為潮熱火動於下則為精濁為泄瀉若先見血止血為先其餘流傳變症雖多亦必歸重於一經假如現有精濁又加之腰酸腰背拘急知其邪在腎也現有咯血多汗加之驚惕口舌生瘡知其邪在心也現有喘咳嗽血加之皮枯鼻塞聲沈知其邪在肺也現有夢遺加之脇痛多急頸核知其邪在肝也現有泄瀉加之腹痛痞塊飲食無味四肢倦怠知其邪在脾也當隨其邪之所在調之○勞熱清骨散內熱保其湯補熱黃芪驚中湯○勞血咯血大平丸嗽吐咳咯保和湯血去多二黃補血湯血不止大平丸散畢范葉石散○勞嗽乾咳人參潤肺丸保和湯大平丸

字附湯肺痿知母茯苓湯肺癰桔梗湯單白艾散○勞壯
白木膏八珍湯腎氣丸○勞汗黃芪散更當於各病本條
參初與開關起胃房勞者倦也氣血勞倦不運則凝滯
則上焦不行下脘不通熱薰胃中而生內熱凡頭上有核
腹中有塊或當臍水冷或無力言動皆痰涎結聚氣血凝
滯之所致也故以開關起胃為先蓋開脾則氣血乾枯
胃氣弱則藥無由行但陽虛不可偏用辛香丁附之類
虛不可偏用苦寒知柏之類永立有開關散定胃散今亦
難用竊其意推之○陽病開關清熱利便宜瀉白散如銀
柴胡秦艽桔梗木通澤瀉當歸芍藥木香以小使多為病
去○陰病開關行痰利氣宜二陳湯加便製香附貝母
升皮當歸山查蘇梗及生地木香少許以氣清痰少為病
減○陰陽俱用參苓白朮散三白湯或二陳湯加白朮神
效麥芽以起脾胃如有泄者尤宜多服久服俟胃氣轉然
後依症用藥○古方以生犀散防風當歸飲或三鞭丸
黃連丸治熱癆症然必初久則平補火自熄久虛積損成
起體實而後敢用之也

散十全大補湯人參養榮湯補中益氣湯單人參湯○陰
虛加味逍遙散滋陰降火湯節齋四物湯補陰丸大造丸
補天丸虛甚者瓊玉膏白鳳膏○古云服東藥百無一生
飲搜捕萬無一死惟脾胃虛及氣血弱者必以滋補藥中
量入童便以代降火之藥俗非偏用知柏生地潯脾則
又偏用人參桂附助火治咳輒用地鈴紫苑款冬青黛牡
蠣收澀肝經治血輒用京墨金石寒涼傷其氣血退潮輒
用蘇柴胡胡黃連消其肌肉遺精輒用龍骨石脂滋燥其
精皆不治
其本取扶正祛邪虫亦亡虫亦氣血凝滯痰與瘀血化
換青蒿硃砂之類而虫自亡矣紫河車用紫河車丸青蒿
膏蛤蚧散天靈蓋散選用○傳屍之說不必深泥歷觀廢
療皆因酒色財氣損傷心血以致虛火妄動醫者不分陰
陽用藥病家不思疾由自取徃徃歸咎前人積患甚則疑
及房屋與血墳墓且窳業飛屍逆相傳在古人亦云癆瘵
三十六種惟陰德可以斷之不幸患此疾者或入山林或
居靜室清心靜坐常焚香叩齒專意保養節食戒慾呼
病可斷根若不遵此禁忌服藥不效我有言

真藥石改酒色財氣過遷善篤信天理內穿蒼

諸虫

九虫皆因臟氣弱濕熱薰蒸癰瘰成諸虫皆因飲食不節

腥膾炙煔或驚覓同食以致中脘氣虛不運而成積積久

成熱濕熱薰蒸癰瘰瘰癧血凝結隨五行之氣變化而為諸

般奇怪之形若腐草為螢是也九虫一日伏虫長四寸許

為諸虫之長二曰蛔虫長尺許貫心即殺人三曰白虫長

一寸母子相生其形轉大而長亦能殺人四曰肉虫狀如爛

杏五肺虫其狀如蠶六蛔虫狀如蝦蟆七弱虫又名瞓虫

狀如瓜瓣八赤虫狀如生肉九蟯虫狀如菜虫形至細微

肺虫令人咳嗽蛔虫令人嘔吐既逆喜噦嘈雜瘡癰痔漏

瘰癧鳴蟯虫居廣腸多則為痔劇則為癰癰又有感觸蟲

疽疥癰蟲之為害赤虫令人腸鳴

動物心腹刺痛藥不靈

或山桐蛇虺水蛭遺精誤飲其水或草木果品虫聚其毒設食以致

心腹刺痛或引腰脇時作時止諸

婦人鬼胎兒血驚婦人

藥不効乃虫症也雄砂九止之

經閉

腹大僅一月間便能動作乃至過期不產或有腹痛此必

虫症雄砂九或萬應九主之。血驚小兒最多太人間有

益驚因積痰而成故也追虫打驚九不敢下者

釣虫黑白丸亦好但釣後須服調脾和胃藥眼鼻下黑

蟬瓜明

凡虫症眼眶鼻下青黑面色痿黃臉上有幾條血絲如蟬瓜分明飲食不進肌肉不生沈重寒熱若

不早治相生不

已貫心殺入

傳屍癆虫十八種

傳屍自上下注下病與前人相似故又曰症化精

血歸於元陽之內變幻種類最多古謂第一代虫如嬰兒

或如鬼或如蝦蟇遇丙丁日食起醉歸心俞第二代虫如

亂髮或如守宮或如蜈蚣或如蛇蟻遇庚辛日食起醉歸

俞第三代虫如蛟如蟻或如螭蟬或如刺蝟遇庚辛日食

起醉歸厥陰第四代虫如亂絲或如猪肝或如蝨蚘如蛇

遇戊己日食起醉歸脾俞第五代虫如繫龜或首頭無足

或者足無頭或如鼠或如精血遇甲乙日食起醉歸肝俞
第六代虫如馬尾有兩條一雌一雄或如驚有頭足尾或
如爛麤或長或短遇丑亥日食起醉歸腎俞遇而復始凡
取勝虫依五臟方選用必俟其大醉日方可取之取後隨
補各臟如取脾虫後則補脾取腎虫後則補腎若病甚者
不分臟腑只用追病丹以斷其根又直輕者只用鰻鱺魚
煮食或紫河車丹陽虛者金匱丹最妙○取勝虫法先令
病家用皮紙糊一密室不留些罅隙擇一老成人過庭以
安息香水洒其榻進之令身以雄黃雌黃塗耳目口鼻上
安排鉄鉗一把布巾一幅用香油二斤以鍋盛頓微煎令
沸仍用高桶一箇以石灰在桶内生布巾蓋桶口俟月初
虫頭向上却服取虫藥五更初一服五更三點時一服服
藥後腹中疼痛如刀斧劈不妨至巳時必須下虫或取下
臭穢如膠漆或吐瀉膿血穢塊皆於灰桶中共虫或從汗
出紫蠟苗狀或從耳鼻口中出或小便中出異般形狀不
一或青黑或黃紅大者急用鉄鉗取入油中煎當日將油
紙裹虫入瓦罐內石灰填實埋於深山遠僻之處免再染
人其患人衣被床席並皆棄去醫人分付藥後亦須避

其取下虫色白者食臟腑脂膏可三十日服藥補之虫色
黃赤者食人血肉可六十日服藥補之虫色紫黑者食人
精髓病傳至腎可謂極矣異其萬一或為子孫害則
可又虫頭白者亦難治此危氏說也丹溪謂不必深泥

肺咯血必損聲 癆虫須分五臟寄居肺間正所謂膏之上
盲之下針之不到藥之不行只宜早灸膏

至四花為佳若蝕肺系則咯血吐痰聲嘶思食無厭病速
至此未易治療○又有應聲虫每語喉中如有物作聲相

應者有八教誦本草至雷丸則無聲
乃頃服數枚而愈仙感靈症見各條 **虛先溫補後追逐** 虛體

者俱宜先用溫補扶其元氣然後用王道之藥佐以中一
殺虫之劑如化虫丸史君予九五膈下氣丸之類或追虫

後而繼以溫補亦可不然 **實則吐下量體行** 體實虫攻上
則虫去而元氣亦散矣 實則吐下量體行 膈心腹疝痛

用樟木屑煎湯服之大吐虫痛殺後煎甘草湯與之
和胃如有積自吐虫若用黑錫灰橫柳等分為末米飲下

○上虫用追虫丸取積藥苦練根
萬應丸萬病解毒丹量體選用

求嗣

求嗣之理非玄微

山無不草木人無不生育婦人要經調

虛靜流而不能直射子宮多不成胎蓋因平時嗜慾不節

施泄太多所致宜補精元兼用靜工存養無令妄動候陽

精充實依時而合一舉而成矣女人陰血衰弱雖投真精

不能攝入子宮雖交而不孕雖孕而不育是以男女配合

必當其年未算之女陰氣未完慾盛之婦所生多女性行

和者經調易挾性行妬者月水不勻相貌惡者刑重稟容

媚者福薄太肥嗜滿子宮不能受精太瘦精血無病交合

時

男精女血皆兼氣血陰陽總屬腎真命門精血充盈別

無難病宜交會得時乃成胎孕凡經盡一日至二日新

血未盛情勝其血男胎成矣四日至六日新血漸長血勝

其精女胎成矣六日至十日鮮有成者縱成亦皆女胎欲

求子者全在經盡三日以裏於夜半子時生氣海精受雄

必若斯時男女無暴怒毋醉飽毋食炙燂辛熱毋用他術

贊益陰陽和平精血調暢交而必孕孕而必育育而為子
且毒娘後宜內遠七情薄五味大冷大熱之物皆在所禁
蓋子食母氣以成形受母味以養精苟無胎動胎痛漏血
及風寒外邪不可輕易服藥亦不得交合觸動慾火生後
攝養一如胎前蓋母食熱則乳熱母食寒則乳寒母
食膏粱饗烈之物則乳毒有是數者子受其害矣 寡慾

清心為上策

寡慾則不妄交合積氣儲精待時而動故能
有子凡心有所動即是慾心主血而藏神腎

主精而藏志心神外馳則腎志內亂其於交會之際殊無
靜一清寧之氣所泄之物同歸腐爛而已安能發育長養

於其間哉慾寡神完不惟多子服藥陰陽貴得宜若見命

抑亦多壽故養生莫善於寡慾

細或絕陽事痿弱法當補陽若見命門脉洪大鼓擊陽事

堅舉是為相火妄動法當滋陰若或腎脉浮大孔緊遺精

尿血法當補陰若帶洪數兼以瀉火若見腎脉微甚欲絕

別無相火為病法當陰陽雙補陽脫痿弱精冷而薄或來

慢不能直射子宮命脉微細者還少丹打老兒丸精清淡

若覺知丸陽痿不舉命門脉虛欲脫者巨勝子丸壯陽丹

腎氣欠旺來慢不能直射子宮者續嗣丹溫腎丸精漏無
火者金鎖思仙丹陰虛有火者大造丸腎氣丸補陰丸虎
骨丸四十以後縱有火動者只宜小兒絲子丸天門冬膏
忌用知柏芍藥寒涼陰陽兩虛者八味丸二神交濟丹通
用種子大補丸玄北太極丸五子衍宗丸十子丸加味蒼
朮骨何首烏丸○女宜鼓動微陽女金丹益壽丸大小烏
雞丸調養經血四製香附丸七製香附丸十味香附丸墨
附丸單醋附丸百子附歸丸琥珀調經丸加味養榮丸加
味益母膏滋陰百補丸大造丸補陰丸○依症選用不可
慕乃各之美珍藥之異而生自傷根按本亦不可過服熱
藥以遺子患古云父吞剛則子患熱淋且性燥多火男女
皆然况造化之妙豈可專恃藥餌必也改過遷善懲忿窒
慾人倫日用無所欺肆買賣交易不致刻
剥自然德可動天生子必賢且壽勉之

養老 附鬚髮

老人無非血液衰

兩腎中間白膜之內一熱動氣大如筋
頭鼓舞變化開闔週身薰蒸二焦消化

水穀外禦六淫內當萬慮晝夜無停年老精血俱耗平居
七竅反常啼號無淚笑如雨流鼻不嚏而出涕耳無聲而
蟬鳴嚙食口乾寐則涎溢溲不利而自遺便不通而
或泄晝則對人瞋瞞夜則獨卧惺惺此老人之病也火動

風痰百病摧陽虛氣盛兩手脈大緊數飲食倍進臉紅神
健雖時有煩渴膈熱大便秘結但以平和湯

藥消解切勿不可用苦寒疎瀉○火症風症戰掉氣亂目直
口禁筋急者通聖散或二陳湯三子養親湯清氣化痰

九節齋化痰丸凡年老覺小便短少即是病進宜卻病延
壽湯小便頻數者腎氣丸去澤瀉加茯神益智五味子大

便燥者搜風順氣丸除虛筋骨痿弱足膝無力者加味補腎丸亦有脾虛多積滯若果是從

陽之氣一向懣之之人全在斟酌湯劑當加溫補調停饅
粥以爲養治宜補中益氣湯橘半枳朮丸平胃散竹瀝枳

朮溫和丸散可扶培之任是衰老不宜峻補古方固真飲

子神仙訓老丸遇仙益壽丹科金冊五仙丹及諸虛門養
性延年之藥皆可選用厥服藥者只宜食治詳前二卷

鬚鬢少陽髮腎水精不上升白似灰

精氣上升則髮潤而

黑六八以後精華不能上升秋冬令行金剝肺枯以致鬚髮焦枯如灰白色養生者宜預服補精血藥以防之染掠亦非上策○染鬚方用大烏龜一箇饑一二日將飯與肉骨果子烟火之食飼之三五月後夜間以漆盪盛之用薄竹片置盪縫口通氣外放燈一盞盪內作熟龜在內旋轉不已自然撒尿緊急只用麻油烟薰鼻其尿即出先用五倍子炆醋死膠若龜尿得一小鐘入五倍醋半鐘同入磁器內炆一滾即止牛角確收貯每用新筆畧蘸搽髮表上多用則面黑○又方炒五倍一兩銅末四分生食鹽生白礬白麩各二分爲末濃茶調膏搽鬚上俟鬚乾以手撚下○內服烏鬚丸胎髮青鹽各四兩共入確內封固火煨三炷香久冷定取出爲末用何首烏冬青子九蒸九晒旱蓮草枸杞子生地當歸白茯苓各四兩人參二兩以水十碗煮汁五碗去渣熬膏將前二味入內攪勻分作幾小確盛之每空心滾水酒調下三五茶匙因下血多而鬚髮易白者不宜秤金丹亦妙○因吐血失血多者瓊玉膏○因房

室損精易白者還元丹還元秋石丸女貞丹有火者大造
丸。因濕癢癰癩等疾衰白單蒼木膏加味蒼木膏。皮
膚肌骨有風痛痒者何首烏丸陽虛者卻老烏鬚健陽丹
延年益壽不老丹有火者八仙添壽丹是知烏鬚亦必因
症用藥若不顧臟腑專務鬚髮而
刻投丸散是刮腹而藏珠也噫
血燥亦奇哉年來髮落鬚長常也少壯有髮落或鬚亦落者腎虛火炎肺痿內風妄動故也腎氣丸單
天門冬膏主之內風甚者柏葉煎單方用自已髮或胎髮
童男女髮洗淨泥固煨過爲末空心酒下一分兼烏鬚
髮入補藥充外用黑附子蔓荊子柏子仁等分爲末烏
雞脂搗勻瓦罐封固一月取出塗之即生餘詳癩風條

編註醫學入門外集卷之四 終

縣庠緝吾劉君
名時熙贈刻

增



